

Neue Melolonthiden von Mittel- und Süd-Amerika.

Von J. Moser, Ellrich.

Astaena cordobana n. sp.

♂. Oblonga, testacea, nitida. Capite remote punctato, clypeo subquadrato, marginibus fortiter elevatis, angulis anticis rotundatis; antennis testaceis, 8-articulatis, stipitis articulo quarto valde elongato, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice parallelis, levissime sinuatis, antice incurvatis, angulis anticis paulo porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, margine antico medio producto, dorso irregulariter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, sat remote punctatis; pygidio leviter rugoso, umbilicato-punctato. Subtus pectore sat laxè punctato, punctis pilosis, abdominis segmentis juxta latera transversim setosis; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo dimidia parte longiore. — Long. 8 mm.

Argentina (Cordoba). Mus. Hamburg.

Astaena rufobrunnea n. sp.

♂. Oblonga, rufo-brunnea, opaca. Capite subrugoso-punctato, sutura clypeali setosa, clypeo antrorsum paulo angustato, margine antico elevato, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, stipitis articulo quarto fortiter elongato; flabello maris stipite paulo breviorè; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis paulo porrectis, angulis posticis rotundatis, margine antico medio leviter producto, dorso sericeo, dense punctato; scutello punctis nonnullis instructo; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, parce punctatis; pygidio mediocriter crebre punctato, postice piloso. Subtus pectore utrinque juxta medium setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis pilosis, abdominis segmentis fortiter transversim setosis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo elongato. — Long. 8 mm.

Paraguay.

Astaena argentina n. sp.

♂. Oblonga, rufo-brunnea, sericea, paulo pruinosa. Capite sat dense punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, truncato, lateribus post marginem anticum sinuatis, angulis anticis breviter rotundatis; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace dimidia

parte latiore quam longiore, medio paulo rotundato-dilatato, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, margine antico medio producto, dorso crebre punctato; scutello fere laevi; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, sat remote punctis obtectis; pygidio dense umbilicato-punctato, ante apicem piloso. Subtus pectoris medio parce, pectoris lateribus coxisque posticis densius punctatis, punctis setosis; abdomine sparsim punctato, segmentis singulis transversim setosis, setis in abdominis medio remote positis; tibiis anticis latis, tridentatis, dente primo interdum obsoleto; articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 8,5—9 mm.

Argentina (Santiago d. E., Tucuman). coll. Ohaus.

Astaena Kuntzeni n. sp.

Oblonga, rufo-testacea, opaca. Capite leviter rugoso, dense punctato, clypeo antrorsum haud angustato, margine antico elevato, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali, flabello feminae stipite multo brevior; prothorace transverso, lateribus fortiter curvatis, setosis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis, dorso sat dense punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, sparsim punctis obtectis; pygidio sat crebre punctato, ante apicem erecte piloso. Subtus parce punctata, pectore utrinque juxta medium setoso, abdominis segmentis transversim setosis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 7 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Astaena rufa n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, rufa, opaca. Capite mediocriter dense punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, integro, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, ciliatis, angulis anticis porrectis, acutis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso sat crebre subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, sparsissime punctis obtectis; pygidio pilifero-punctato. Subtus medio parce, juxta latera paulo densius punctata, pectore utrinque juxta medium erecte setosa, abdominis segmentis transversim setosis, femoribus posticis antice et postice setis instructis, margine postico ciliato; tibiis anticis tridentatis, dente primo parvo, articulo basali tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 9 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Astaena obscurifrons n. sp.

♂. Oblonga, ferruginea, nitida, fronte nigra. Capite punctis raris oblecto, clypeo medio paulo convexo, antrorsum angustato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis ferrugineis, 9-articulatis, flabello maris stipite longiore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus setosis, postice subsinuatis, antice incurvatis, angulis anticis et posticis obtusis, illis parum porrectis, margine antico medio producto, dorso remote punctato; scutello fere laevi; elytris leviter sulcatis, subrugoso-punctatis; pygidio sparsissime punctato, ante apicem pilis nonnullis ornato. Subtus medio fere laevis, juxta latera parce punctata, punctis pilosis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo dimidia parte longiore. — Long. 8,5 mm.

Bolivia (Mapiri).

Astaena clypealis n. sp.

♀. Oblonga, postice paulo ampliata, rufa, opaca. Capite nitido, fronte sat remote punctata, utrinque juxta latera leviter impressa, clypeo fere laevi, antrorsum paulo angustato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis, medio carina transversa instructo, postice longitudinaliter carinato; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello feminae stipite paulo brevior; prothorace fere duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus ciliatis, ante medium levissime sinuatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, dorso subtilissime punctato, medio levissime longitudinaliter sulcato; scutello fere laevi; elytris seriato-punctatis, interstitiis convexis, impunctatis; pygidio sat dense punctato, ante apicem longe piloso. Subtus pectoris medio pilis longis erectis ornato, pectoris lateribus haud dense umbilicato-punctatis, abdomine nitido, segmentis singulis antice setosis, postice laevibus; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo duplo longiore. — Long. 13—14 mm.

Ecuador (Macas, Rio Pastassa). coll. Ohaus.

Astaena corumbana n. sp.

♂. *A. tenellulae* Mos. similis. Rufo-brunnea, subnitida. Capite sat dense punctato, clypeo subquadrato, margine antico fortiter elevato, truncato, medio levissime producto; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, ciliatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis, margine antico medio producto, dorso crebre sat subtiliter punctato; scutello

fere laevi; elytris seriato-punctatis, interstitiis parum convexis, mediocriter crebre punctis obtectis, elytrorum lateribus ciliatis; pygidio sat sparsim punctato, apice piloso. Subtus laxe punctata, abdominis segmentis transversim setosis; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posteriorum secundo dimidia parte longiore. — Long. 8 mm.

Matto Grosso (Corumba).

Die Art ist ein wenig kleiner als *tenellula* Mos., der Clypeus ist länger und schmaler, sein Vorderrand ist höher und rechtwinklig vom Seitenrande abgesetzt. Die vorliegenden Exemplare sind schwach glänzend, doch kann die Tomentbekleidung abgerieben sein.

Astaena pilosa n. sp.

Oblonga, rufo-ferruginea, opaca, flavo-pilosa. Capite, fronte sat crebre punctata, punctis magnitudine inaequalibus, punctis majoribus erecte setosis, clypeo antrorsum paulo angustato, margine antico fortiter elevato, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine subaequali, flabello feminae multo brevior; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus curvatis, ciliatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, dorso sat dense punctato, punctis magnitudine inaequalibus, punctis majoribus pilis erectis ornatis; elytris mediocriter dense punctatis, erecte pilosis; pygidio sat crebre punctis obtecto, punctis pilis erectis vestitis. Subtus pectore medio laxo, ad latera versus densius setifero-punctato, abdomine mediocriter dense erecte setoso; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posteriorum elongato. — Long. 9 mm.

Argentina. coll. Ohaus.

Astaena Ohausi n. sp.

♂. Testacea, nitida, capite, prothorace, scutello pedibusque rufo-testaceis. Capite sat dense punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, truncato, angulis anticis breviter rotundatis, lateribus post angulos anticos sinuatis; antennis testaceis, 8-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, ciliatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, dorso dense punctato; scutello punctis nonnullis obtecto; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, sparsim punctis instructis; pygidio fortiter subrugoso-punctato, ante apicem parce piloso. Subtus medio fere laevis, juxta latera laxo punctata, abdominis segmentis, medio excepto, transversim setosis;

tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 6—7 mm.

Brasilia (Sao Paulo). coll. Ohaus.

Astaena heterophylla n. sp.

Oblonga, rufo-fusca, subopaca, sericea. Capite, fronte sat dense, clypeo parce punctato, clypei margine antico fortiter elevato, truncato, angulis anticis rotundatis, clypei medio leviter convexo; antennis rufo-testaceis, 8-articulatis, stipitis articulo quarto elongato, basi spinosa, flabello maris 4-articulato, stipite longiore, leviter curvato, flabello feminae 3-articulato, stipite multo brevior; prothorace transverso, lateribus fortiter curvatis, ciliatis, angulis anticis porrectis, acutis, angulis posticis obtusis, margine antico medio leviter producto, dorso dense punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, mediocriter crebre punctis obtectis; pygidio fortiter punctato, ante apicem setoso. Subtus pectore medio sparsim, juxta latera densius punctato, utrinque juxta medium setis nonnullis erectis instructo, coxis posticis parce punctatis, punctis setosis, abdominis segmentis transversim setosis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo elongato. — Long. 8 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Symmela seticollis n. sp.

S. varianti Er. similis. Nigra, supra opaca, antennis, elytrorum parte anteriore pedibusque rufis. Capite punctato, fronte punctis nonnullis validioribus setosis ornato, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, sinuato, angulis anticis rotundatis, mento longe et dense flavido-piloso; prothorace sat crebre punctato, post marginem anticum et juxta latere setis nonnullis pallidis instructo; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis; pygidio pectoreque parce punctatis, punctis griseo-setosis; abdomine transversim setoso; tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis maris normalibus. — Long. 5 mm.

Brasilia (Matto Grosso), Paraguay.

Symmela corumbana n. sp.

Oblonga, sericea, testacea, fronte, prothoracis disco, elytrorum parte apicali abdomineque saepe nigrescentibus. Capite fere laevi, fronte paulo deplanata, clypeo antrorsum paulo angustato, margine antico elevato, truncato, angulis anticis brevissime rotundatis; antennis rufo-flavis, flabello nigrescente; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis, dorso subtiliter punctato; elytris seriato-

punctatis, interstitiis paulo convexis, laevibus; pygidio maris subtiliter, feminae fortius punctato. Subtus parce punctata, abdominis segmentis transversim setosis; tibiis anticis bidentatis, articulis omnibus tarsorum anticorum in mare ad apicem versus dilatatis. — Long. 5 mm.

Matto Grosso (Corumba).

Calodactylus niveosignatus n. sp.

Statura *C. tibialis* Blanch. Niger, nitidus, prothorace interdum fusco, elytris ferrugineis, pygidio, femoribus, interdum etiam tibiis rufo-testaceis. Capite rugoso-punctato, griseo-setoso, clypeo interdum rufo, antrorsum angustato, margine antico elevato, sub-sinuato; antennis stipite testaceo, flabello piceo; prothorace longitudine vix latiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso confertim punctato, punctis pilis griseis vel ochraceis vestitis, pilis nonnullis longis albis erectis, margine laterali vittaque media longitudinali niveo-squamosis, squamis angustis; scutello niveo-squamoso-setoso; elytris dense aciculato-punctatis, punctis pilis recumbentibus flavo-griseis instructis, setis longis albis erectis praecipue post elytrorum basim positas, sutura elytrorumque lateribus anguste infuscatis; pygidio confertim punctato, punctis ochraceo-vel albo-setosis, setis albis validioribus, setis longis erectis intermixtis. Subtus cinereo-pilosus, abdominis medio glabro, intido. — Long. 8,5—9 mm.

Brasilia (Minas Geraes: Passa Quatro). J. Zikan leg.

Calodactylus vittipennis n. sp.

Parvus, ferrugineus, griseo-setosus. Capite setis adpressis obtecto, clypei margine antico truncato, angulis rotundatis; antennis ferrugineis, 9-articulatis, flabello in utroque sexu stipite brevioris; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso setis adpressis vestito, vitta media longitudinali pallidioris; scutello albo-setoso; elytris cinereo-setosis, elytris singulis vittis 4 albidis ornatis, vitta juxtasuturali plerumque indistincta, vitta tertia postice abbreviata, vittarum setis squamiformibus; pygidio setifero-punctato, in femina medio longitudinaliter sulcato, ante apicem impresso. Subtus cinereo-setosus, abdomine maris medio laevi, segmento ultimo verrucoso, breviter ochraceo-setoso; tibiis anticis bidentatis. — Long. 6—7 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Heteronyx corumbanus n. sp.

H. cuyabano Mos. simillimus. Fuscus, nitidus, ubique dense punctatus, punctis pilis flavidis fere adpressis vestitis. Clypeo

marginè antico late rotundato, vix subsinuato; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, flabello parvo; prothorace transverso, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis, marginè antico medio leviter producto; elytris haud costatis; tibiis anticis bidentatis, unguibus apice fissis, dente apicali angustiore. — Long. 6 mm.

Matto Grosso (Corumba).

Die Art ist dem *H. cuyabanus* Mos. sehr ähnlich, doch ist der Clypeus nach vorn nicht so stark verjüngt und daher länger, sein Vorderrand zeigt kaum die Andeutung einer Buchtung, während er bei *cuyabanus* zwar schwach aber deutlich gebuchtet ist.

Liogenys corumbanus n. sp.

L. quadridenti Fab. similis, minor. Testaceus, nitidus, capite, prothorace scutelloque rufis. Capite, fronte sat remote, clypeo paulo densius punctato, fronte leviter impressa, clypei marginè antico profunde triangulariter exciso; antennis ferrugineis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu stipite breviorè; prothorace latiorè quam longiorè, paulo post medium fortiter rotundato-dilatato, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso sat crebre punctato; scutello fere laevi; elytris mediocriter dense punctatis, singulis quadricostatis, costis planis; pygidio leviter alutaceo, haud crebre punctato. Subtus remote punctatus, punctis pilosis; tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis et mediis in mare modice dilatatis, articulo secundo caeteris latiorè. — Long. 7—8 mm.

Matto Grosso (Corumba).

Liogenys Kuntzeni n. sp.

Oblongus, rufo-testaceus, nitidus. Capite, vertice frontisque medio laevibus exceptis, punctato, clypeo producto, marginè antico reflexo, sinuato, angulis in mare sat acutis, in femina breviter rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello flavo, stipite breviorè; prothorace transverso, medio rotundato-dilatato, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso sat dense punctato; scutello laevi; elytris alutaccis, subrugoso-punctatis, punctis juxta elytrorum latera breviter setosis, elytris singulis quadricostatis; pygidio sparsissime setifero-punctato. Subtus pectore sat remote irregulariter punctis obtecto, punctis setosis, abdomine medio fere laevi, lateribus sparsim setifero-punctatis; tibiis anticis maris bidentatis, feminae tridentatis; tarsis anticis et mediis in mare dilatatis, unguibus dente apicali longiorè. — Long. 10 mm.

Chile. Mus. Berol.

Liogenys densicollis n. sp.

L. opacicolli Frm. similis. Nigro-fuscus, supra breviter erecte flavido-pilosus. Capite dense punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico profunde sinuato, angulis acutis; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso confertim punctato; scutello sat dense punctis obtecto, linea media paulo elevata sublaevi; elytris subrugoso-punctatis, singulis quadricostatis; pygidio crebre punctato, punctis albido-squamosis. Subtus lateribus dense, medio sparsim albido-squamosus, parce setosus; tibiis anticis acute tridentatis, tarsis anticis in mare modice dilatatis. — Long. 8.5—9 mm.

Argentina (Santiago del Estero).

Dem *L. opacicollis* Frm. sehr ähnlich, etwas kleiner und dunkler gefärbt. Die Punktierung der Oberseite ist kräftiger, die Vorderecken des Clypeus sind schärfer.

Liogenys cribricollis n. sp.

Praecedenti similis, differt clypei margine antico bidentato. — Long. 11 mm.

Argentina (Chaco de Santiago del Estero).

Etwas größer als die vorstehende Art und dadurch unterschieden, daß die Seitenränder des Clypeus hinter den Vorderecken gebuchtet sind, wodurch der Vorderrand zweizählig erscheint.

Liogenys Gebieni n. sp.

Oblongo-ovalis, niger, nitidus. Capite sat dense punctato, clypeo producto, antrorsum angustato, margine antico medio exciso, angulis rotundatis; antennis flavo-testaceis; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis obtusis, haud productis, angulis posticis rotundatis, dorso medio sat remote, ad latera versus paulo densius punctato; scutello punctis nonnullis obtecto; elytris mediocriter crebre subrugoso-punctatis, singulis costis 4 angustis laevibus instructis; pygidio sat dense punctato, medio interdum laevi. Subtus laxè punctatus, tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis in mare modice dilatatis, intus barbatus. — Long. 10 mm.

Columbia (La Garita Geb.). W. Fritsche leg. 1912. Mus. Hamburg.

Liogenys elegans Nonfr. = (*brasiliensis* Mos.)

Gama fuscoaenea n. sp.

Oblonga, fusco-aenea, subnitida. Capite crebre rugoso-punctato, clypeo maris producto, truncato, clypeo feminae margine

antico late rotundato; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello in utroque sexu sat parvo; prothorace paulo latiore quam longiore, post medium rotundato-dilatato, lateribus postice sinuatis, angulis anticis et posticis fere rectangulis, dorso dense punctato, parce griseo-setoso, prothoracis margine postico ante scutellum marginato; scutello setifero-punctato; elytris indistincte costatis, alutaceis, subrugoso-punctatis, parce griseo-setosis, setis longitudine inaequalibus; pygidio dense umbilicato-punctato, punctis erecte griseo-pilosis, macula parva postbasali laevi. Subtus mediocriter crebre, in mare densius punctata, punctis setis griseis vestitis; tibiis anticis maris bidentatis, feminae tridentatis, tarsis anticis et mediis in mare dilatatis. — Long. 8 mm.

Brasilia (Petropolis). coll. Ohaus.

Der *Harpodactyla metallescens* Mos. sehr ähnlich, jedoch ohne Geschlechtsauszeichnung der Mitteltarsen beim ♂.

Harpodactyla Ohausi n. sp.

♂. *H. fulvipenni* Mos. similis. Oblongo-ovalis, rufo-flava, nitida, elytris fulvis, prothorace paulo viridescente. Capite, fronte scabroso-punctata, punctis flavo-griseo-setosis, clypeo parce punctato, margine antico elevato, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus post medium sinuatis, angulis anticis et posticis acutis, dorso sat remote punctato, punctis pilis griseis adpressis vestitis, pilis nonnullis erectis; scutello setifero-punctato; elytris rugoso-punctatis, obsolete costatis, parce griseo-piloso-setosis; pygidio umbilicato-punctato, punctis griseo-pilosis. Subtus medio parce, juxta latera densius pilifero-punctata; tibiis anticis tridentatis, tarsis mediis in mare articulo basali intus apice dente recurvo armato. — Long. 7 mm.

Brasilien (Sao Paulo). coll. Ohaus.

Von *H. fulvipennis* Mos. durch die viel dichtere Punktierung der Flügeldecken unterschieden.

Harpodactyla angustula n. sp.

Oblonga, rufo-fusca, nitida, paulo viridi-micans. Capite, fronte confertim, clypeo parce punctato, clypeo margine antico reflexo, late rotundato; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello in utroque sexu stipite brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus post medium sinuatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat sparsim punctato, punctis juxta thoracis latera et ante marginem posticum griseo-pilosis; scutello punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis parce

irregulariter punctis obtectis, punctis pilis griseis vestitis; pygidio crebre annulato-punctato, punctis erecte griseo-pilosis. Subtus sat remote pilifero-punctata, tibiis anticis tridentatis, tarsis mediis in mare articulo basali apice dente recurvo armatis. — Long. 7,5 mm.

Brasilia (Novo Friburgo). Beske leg.

Anoplosiagum macrophyllum n. sp.

♂. Oblongum, rufum vel nigrum, nitidum. Capite fortiter subrugoso-punctato, fronte setosa, clypeo semicirculari; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali, leviter curvato, stipitis articulo sexto lamellato; prothorace postice dimidia parte latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus ciliatis, angulis anticis paulo productis, acutis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, dorso sat remote irregulariter punctato; scutello juxta latera punctis nonnullis instructo; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, interstitiis alternis convexioribus, laevibus; pygidio dense umbilicato-punctato, punctis erecte flavido-pilosis. Subtus crebre punctatum, punctis pilis vestitis; tibiis anticis tridentatis, unguibus apice fissis, dente apicali paulo angustiore. — Long. 13—16 mm.

Paraguay (Asuncion). coll. Ohaus.

Die Art ist dem *A. sulcatulum* Burm. ähnlich, aber durch den längeren leicht gebogenen Fühlerfächer des ♂ unterschieden.

Anoplosiagum Kuntzeni n. sp.

♂. Oblongum, rufo-castaneum, nitidum, capite prothoraceque obscuriobus. Capite grosse punctato, clypeo rotundato; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite paulo brevior; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso remote punctato; scutello juxta latera punctato; elytris subrugosis, sparsim irregulariter punctatis, punctis ante elytrorum apicem griso-flavo-pilosis, elytris singulis obsolete tricostatis; pygidio laxo punctato, punctis erecte setosis. Subtus crebre punctatum, punctis flavido-pilosis; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore, unguibus dente apicali angustiore. — Long. 14 mm.

Columbia 2 ♂♂ Mus. Berol., 2 Ex. coll. Schaufuss mit Fundort Brasilia.

Anoplosiagum Gebieni n. sp.

♂. *A. sulcatulo* Burm. similis, minor. Parvum, oblongum, supra nigrum, subtus rufum, nitidum. Capite, fronte rugoso-punctata, punctis setosis, clypeo laevi, late rotundato; antennis

rufo-testaceis, 9-articulatis, flabello maris articulis 5 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace paulo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis obtusis, lateribus marginatis, crenulatis, dorso subtiliter punctato, juxta latera plus minusve rufescente; scutello fere laevi; elytris seriato-punctatis, juxta latera interstitioque primo dense punctatis interstitiis caeteris laevibus; pygidio pilifero-punctato. Subtus pectoris medio laevi, pectoris lateribus grosse punctatis, punctis pilosis; abdomine sparsim longe setoso, tibiis anticis bidentatis, unguibus apice fassis, dente apicali angustiore et brevior. — Long. 6—8 mm.

Brasilia (Bahia). Mus. Hamburg.

Anoplosiagum antennale n. sp.

♂. Supra nigro-fuscum, subtus fuscum, nitidum, aenescens. Capite granuloso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, apice rotundato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite longiore, leviter curvato; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat remote, sat subtiliter punctato; scutello parce punctato; elytris leviter rugosis, irregulariter seriato-punctatis, interstitiis sparsim, juxta elytrorum latera densius punctatis, punctis nonnullis breviter setosis; pygidio dense et fortiter umbilicato-punctato, punctis erecte flavido-setosis. Subtus pectoris medio parce, pectoris lateribus coxis posticis abdomineque densius punctatis, punctis piloso-setosis; tibiis anticis bidentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longitudine aequali, unguibus apice fassis, dente apicali paulo angustiore haud brevior. — Long. 10—11 mm.

Amazonasgebiet (Obidos). coll. Ohaus.

Die Art ist durch die zehngliedrigen Fühler und den langen Fühlerfächer des ♂ ausgezeichnet.

Philochlaenia aequatorialis n. sp.

Ph. aeruginosae Burm. similis et affinis. Fusca, aeneo-micans, griseo-setosa. Capite dense punctato, fronte setosa, clypeo profunde sinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu parvo; prothorace postice duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis paulo productis, angulis posticis obtusis, dorso, vitta media longitudinali excepta, dense punctato, punctis breviter setosis, punctis nonnullis in prothoracis parte anteriore longioribus, erectis; scutello juxta latera setifero-punctato; elytris crebre subrugoso-punctatis, punctis setis adpressis instructis, costis elevatis, laevibus, maculis setosis interruptis; pygidio dense umbilicato-punctato, punctis setosis, ante

pygidii apicem erecte pilosis, macula parva postbasali laevi. Subtus confertim punctata, punctis griseo-pilosis; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posteriorum secundo longiore. — Long. 14–15 mm.

Ecuador (Bucay). Dr. F. Ohaus leg. 11. IV. 1905.

Von *Ph. aeruginosa* Burm. durch das dichter punktierte Halschild unterschieden, von *pavida* Burm. durch Färbung, stärkeren Glanz und durch die deutlichen glatten Makel auf den Rippen der Flügeldecken.

Philochlaenia Ohausiana n. sp.

Ex affinitate *Ph. aeruginosae* Burm. Nigro-fusca, paulo aenesens, nitida, flavido-pilosa-setosa. Capite crebre et fortiter punctato, fronte leviter rugosa, frontis punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-fuscis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo, feminae multo brevior; prothorace postice fere duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso mediocriter crebre sat fortiter punctato, punctis pilis recumbentibus vestitis; scutello plus minusve setifero-punctato; elytris alutaceis, transversim rugosis, sat crebre punctatis, punctis breviter setosis, costis paulo elevatis, maculis laevibus setosisque ornatis, callo apicali transversim setoso; pygidio umbilicato-punctato, punctis piloso-setosis, pilis ad pygidii apicem versus longioribus. Subtus ubique dense punctata et flavido-piloso-setosa, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posteriorum secundo longiore. — Long. 18 mm.

Ecuador (Llanos). Feyer leg. coll. Ohaus.

Etwas größer als *Ph. aeruginosa* Burm. Die Punktierung der Oberseite größer.

Philochlaenia tolimana n. sp.

♂. Ex affinitate *Ph. aeruginosae* Burm. Rufo-fusca, nitida, griseo-piloso-setosa, capite prothoraceque nigro-fuscis. Capite rugoso-punctato, punctis setosis, clypeo sat longo, antrorsum angustato, margine antico medio breviter exciso, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace transverso, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso laxe fortiter punctato, punctis pilis erectis vestitis; scutello punctato, apice lineaque media longitudinali laevibus; elytris transversim rugosis, remote et irregulariter setis fere adpressis ornatis, pilis nonnullis erectis, costis paulo elevatis, plus minusve laevibus; pygidio sparsim pilifero-punctato. Subtus pectore dense flavo-villoso, abdomine crebre punctato, punctis flavo-griseo-pilosis, tibiis anticis triden-

tatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 17 mm.

Columbia (Monte Tolima). A. H. Fassl leg. I. 1910.

Philochlaenia apicalis n. sp.

♂. Oblonga, rufo-castanea, nitida, capite prothoraceque obscurioribus. Capite fortiter subrugoso-punctato, punctis juxta oculos erecte setosis, vertice laevi, clypeo antrorsum angustato, margine antico sat profunde sinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo brevior, stipitis articulo tertio elongato; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso parce fortiter punctato; scutello in parte basali punctato; elytris transversim rugosis, parce et irregulariter setis cinereis vestitis, callo apicali fascia transversa, dense setifero-punctata, ornato; pygidio sparsissime punctato, punctis erecte pilosis. Subtus pectore dense flavo-villoso, abdomine crebre, medio parcius, punctato, punctis pilis instructis; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 18 mm.

Ecuador. Baron leg.

Philochlaenia sericea n. sp.

Ph. pavidae Burm. similis et affinis. Rufo-fusca, supra subopaca, sericea, flavo-griseo-setosa, capite, prothorace scutelloque obscurioribus. Capite dense punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico medio profunde triangulariter exciso, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu stipite brevior; prothorace latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat crebre punctato, punctis setis recumbentibus vestitis, setis longioribus erectis intermixtis; scutello setifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis setis fere adpressis ornatis, setis longioribus erectis maculisque nudis subseriatim positis; pygidio crebre punctato, punctis setosis, setis ante pygidii apicem longioribus. Subtus confertim punctata, punctis flavido-pilosis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 15 mm.

Venezuela (Merida).

Durch die rotbraune Färbung und die fast matte, etwas seidenartig schimmernde Oberseite von *aeruginosa* Burm. und *pavida* Burm. unterschieden. Von letzterer Art auch durch den tiefer ausgeschnittenen Vorderrand des Clypeus.

Philochlaenia rugipennis n. sp.

♂. *Ph. aeruginosae* Burm. similis. Rufo-fusca, nitida, supra parce cinereo-setosa, capite prothoraceque obscurioribus. Capite mediocriter dense punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-testaceis, 10-articulatis, flabello stipite paulo brevioribus; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso leviter rugoso, haud dense inaequaliter annulato-punctato, parce setoso; scutello setifero-punctato; elytris rugoso-punctatis, punctis setis minutis instructis, elytris singulis quadricostatis, costis interruptis, maculis laevibus et setis longioribus ornatis, callo apicali densius setoso; pygidio leviter rugoso, annulato-punctato, punctis erecte pilosis. Subtus ubique flavo-pilosa, tibiis anticis tridentatis, dente primo minuto, articulo basali tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 13 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Philochlaenia pilicollis n. sp.

♂. Breviter ovata, fusco-aenea, nitida, griseo-pilosa. Capite, fronte grosse subrugoso-punctata, punctis setosis, clypeo fortiter punctato, margine antico elevato, late rotundato; antennis ferrugineis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat remote punctato, punctis pilis longis recumbentibus vestitis; scutello, medio excepto, setifero-punctato; elytris singulis quadricostatis, transversim rugosis, irregulariter pilis brevibus recumbentibus obtectis, pilis longis suberectis in elytrorum parte basali positibus; pygidio umbilicato-punctato, punctis longe pilosis. Subtus pectore dense flavo-villoso, abdomine pedibusque pilifero-punctatis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 8—9 mm.

Ecuador (Quito). Dr. Fr. Ohaus leg. 26. XI. 05.

Philochlaenia sinuaticeps n. sp.

♂. *Ph. rugulosipenni* Blanch. similis. Nigro-fusca, nitida, paulo cuprascens, griseo-setosa. Capite dense subrugoso-punctato, fronte griseo-setosa, clypeo antrorsum angustato, lateribus sinuatis, margine antico emarginato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo brevioribus; prothorace latiore quam longiore, post medium rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis setis griseis adpressis instructis, linea media longitudinali impunctata; scutello laevi; elytris confertim subrugoso-punctatis, punctis setis parvis adpressis griseis vestitis, elytris singulis

quadricostatis, costis setis nonnullis majoribus ornatis; pygidio densissime aciculato-punctato, punctis setosis. Subtus crebre setifero-punctata; tibiis anticis tridentatis, dente primo obsoleto, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 15,5 mm.

Brasilia (Bahia). coll. Ohaus.

Die Art ist der *Ph. rugulosipennis* Blanch. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch die Clypeusbildung und durch das Fehlen der Zähne am Hinterrande des vierten Bauchsegments.

Philochlaenia coxalis n. sp.

♂. Oblonga, supra fusca, subtus rufo-fusca, nitida, supra breviter griseo-pilosa. Capite dense punctato, fronte setosa, clypeo antrorsum angustato, margine antico sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, gracilibus, 10-articulatis, stipitis articulis 3.—6. elongatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat crebre punctato, punctis pilis recumbentibus vestitis, pilis nonnullis longioribus erectis; scutello pilifero-punctato, macula media laevi; elytris rugoso-punctatis, punctis pilis griseis adpressis instructis, elytris singulis quadricostatis, costis maculis denudatis ornatis, callo apicali transversim piloso. Corpore infra cinereo-piloso, pedibus gracilibus, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore, margine interno coxarum posticarum verticaliter lobatim producto. — Long. 11—12 mm.

Ecuador (Loja). Witt leg. coll. Ohaus.

Philochlaenia griseopilosa n. sp.

♂. Oblonga, fusca, nitida, griseo-pilosa, pedibus rufis. Capite subrugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo lato, antrorsum paulo angustato, margine antico reflexo, late sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo brevioribus; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso leviter rugoso, medioeriter crebre punctato, punctis pilis recumbentibus instructis, pilis nonnullis erectis; scutello dense pilifero-punctato; elytris subrugosis, sat crebre punctatis, punctis pilis adpressis griseis ornatis, pilis nonnullis in elytrorum parte posteriore erectis, costis indistinctis; pygidio dense annulato-punctato, punctis pilosis, pilis in pygidii parte anteriore fere adpressis, in parte apicali erectis, pilis longioribus intermixtis. Subtus confertim pilifero-punctata; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posticorum elongato. — Long. 10—11 mm.

Columbia. Mus. Berol.

Philochlaenia bilobata n. sp.

Fusca, subnitida, griseo-setosa, plus minusve aeneo-micans. Capite crebre punctato, vertice setoso, clypeo bilobato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu sat parvo; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis parum acutis, angulis posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis setis recumbentibus instructis; scutello setifero-punctato; elytris dense subrugoso-punctatis, punctis setis recumbentibus vestitis, setis nonnullis longioribus erectis, callo apicali densius setoso; pygidio confertim annulato-punctato, punctis pilosis, pilis ante pygidii apicem longioribus. Subtus dense griseo-pilosa, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 10,5—12 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Philochlaenia duplopilosa n. sp.

Oblonga, postice paulo ampliata, aneo-fusca, nitida, griseo-pilosa. Capite scabroso-punctato, punctis pilosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico paulo elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali, flabello feminae multo brevioris; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, ante medium levissime sinuatis, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis pilosis, pilis recumbentibus, pilis longioribus erectis intermixtis; scutello pilifero-punctato; elytris crebre subrugoso-punctatis, punctis pilis fere adpressis vestitis, pilis longis erectis seriatim positis, elytris singulis quadricostatis; pygidio confertim umbilicato-punctato, punctis pilosis. Subtus cinereo-pilosa, abdominis segmentis tertio quartoque in mare medio tuberculatis; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posticorum secundo paulo longiore. — Long. 9—11 mm.

Brasilia (Parana). Mus. Berol.

Philochlaenia corumbana n. sp.

♂. Fusca, subnitida, elytris opacis, griseo-setosa. Capite dense scabroso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico profunde sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite brevioris; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis setis recumbentibus vestitis; scutello confertim setifero-punctato; elytris dense punctatis, punctis setis adpressis instructis, setis majoribus seriatim positis, callo

apicali fasciculato, spatio post callum laevi; pygidio umbilicato-punctato, punctis setosis. Subtus ubique crebre setis adpressis vestita, tibiis anticis tridentatis, dente primo obsoleto; tarsis posticis articulo primo elongato. — Long. 8,5 mm.

Matto grosso (Corumba).

Die Art ist der *Ph. setifera* Burm. ähnlich, aber schon durch die zehngliedrigen Föhler unterschieden.

Philochlaenia griseovestita n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, fusca, nitida, griseo-setosa. Capite, fronte scabroso-punctata, punctis setosis, clypeo subrugoso-punctato, antrorsum angustato, margine antico paulo elevato, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso confertim punctato, punctis setis griseis fere adpressis instructis; scutello crebre setifero-punctato; elytris dense punctatis, punctis setosis, setis adpressis, elytris singulis quadricostatis, costis plus minusve maculis glabris laevibus ornatis; pygidio confertim umbilicato-punctato, punctis setas ferentibus. Subtus dense punctata, punctis griseo-piloso-setosis; tibiis anticis tridentatis, articulis duobus primis tarsorum posticorum longitudine aequalibus. — Long. 12 mm.

Brasilia (Petropolis). Dr. F. Ohaus leg. X. 1904.

Philochlaenia pilosula n. sp.

♂. *Ph. tomentosae* Burm. affinis. Cupreo-fusca, nitida, flavido-pilosa. Capite rugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite brevior; prothorace transverso, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis pilis erectis, paulo recumbentibus instructis; scutello dense pilifero-punctato; elytris crebre subrugoso-punctatis, punctis pilis recumbentibus vestitis, pilis nonnullis longioribus, elytrorum costis alternis convexioribus; pygidio confertim punctato, punctis erecte pilosis. Subtus dense pilosa, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longior. — Long. 13 mm.

Brasilia.

Die Art ist der *Ph. tomentosa* Burm. sehr ähnlich, etwas robuster. Sie trägt auf den Flügeldecken einige lange aufstehende Haare, doch treten dieselben nicht wie bei *tomentosa* hervor, wo sie deutliche Reihen bilden und etwas borstenartig sind.

Philochlaenia Gebieni n. sp.

♂. Praecedenti similis, sed prothorace multo densius punctato. Fusca, nitida, griseo-pilosa. Capite rugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico subsinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-testaceis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 6 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso creberrime punctis pilosis oblecto; scutello dense pilifero-punctato; elytris leviter costatis, crebre subrugoso-punctatis, punctis pilis adpressis vestitis, pilis nonnullis longioribus erectis; pygidio densissime umbilicato-punctato, punctis pilosis, pilis longitudine inaequalibus. Subtus dense pilis adpressis vestita, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 12 mm.

Brasilia. Mus. Hamburg.

Philochlaenia castaneipennis n. sp.

Oblonga, postice paulo ampliata, castanea, nitida, flavo-griseo-pilosa, capite, prothorace scutelloque obscurioribus. Capite rugoso-punctato, punctis erecte pilosis, clypeo margine reflexo, rotundato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 2.—7. conjunctis paulo longiore, flabello feminae parvo, ovato; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis plus minusve scabrosis et pilis recumbentibus vestitis; scutello dense pilifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis pilosis, elytris singulis quadricostatis; pygidio confertim annulato-punctato, punctis pilis sat longis instructis. Subtus ubique crebre punctata et flavo-griseo-pilosa; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum, posticorum secundo longiore, unguibus apice fissis, dente interno lato. — Long. 15—18 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Philochlaenia paranensis n. sp.

♂. *Ph. centrali* Bruch simillima, praecipue differt antennis 10-articulatis. Rufo-fusca, nitida, flavo-griseo-pilosa. Capite rugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo rotundato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite brevioribus; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis pilis longis recumbentibus et erectis vestitis; scutello confertim pilifero-punctato; elytris dense scabroso-punctatis, punctis pilis adpressis ornatis, pilis erectis intermixtis, costis obsoletis; pygidio

umblicato-punctato, punctis erecte pilosis. Subtus flavo-griseo-pilosa, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 12 mm.

Argentina (Parana). Mus. Berol.

Philochlaenia Kuntzeni n. sp.

♂. *Ph. submetallicae* Blanch. affinis. Viridi-fusca, nitida, griseo-pilosa. Capite dense rugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo margine antico elevato, rotundato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis pilis recumbentibus instructis; scutello dense pilifero-punctato; elytris singulis quadricostatis, crebre subrugoso-punctatis, punctis pilis fere adpressis ornatis; pygidio confertim umblicato-punctato, punctis pilosis. Subtus dense punctata, punctis pilis griseis vestitis, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulis duobus primis longitudine aequalibus. — Long. 12 mm.

Brasilia (Rio Janeiro). Mus. Berol.

Philochlaenia rufa n. sp.

♂. Statura *Ph. puberae* Burm. Rufa, supra parce, subtus paulo densius cinereo-pilosa. Capite rugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo margine antico late rotundato, reflexo; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso laxo punctato, punctis pilis recumbentibus ornatis; scutello pilifero-punctato; elytris subrugosis, parce pilis setiformibus obtectis, costis indistinctis; pygidio crebre annulato-punctato, punctis erecte pilosis, vitta media, plus minusve distincta, laevi. Subtus sat dense pilifero-punctata, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posteriorum secundo longiore. — Long. 9 mm.

Brasilia. Sello leg. Mus. Berol.

Philochlaenia pubens n. sp.

♂. *Ph. puberae* Burm. similis, major. Oblonga, rufa, griseo-pilosa. Capite rugoso-punctato fronte setosa, clypeo subrotundato, margine paulo elevato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, stipitis articulis 3.—6. elongatis, flabello maris stipite paulo brevior; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat grosse punctato, punctis griseo-pilosis; scutello dense pilifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis pilis griseis ornatis, costis obsoletis; pygidio dense umblicato-punctato, punctis pilosis.

Subtus crebre pilifero-punctata, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo paulo longiore. — Long. 10 mm. Columbia.

Philochlaenia pilosa n. sp.

♂. Oblonga, rufa, nitida, pilis adpressis griseis vestita. Capite dense scabroso-punctato, punctis setosis, clypei margine antico reflexo, rotundato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris testaceo, stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat crebre punctato, punctis pilosis; scutello dense pilifero-punctato; elytris leviter costatis, crebre punctis pilosis obtectis; pygidio umbilicato-punctato, punctis pilis erectis instructis. Subtus cinereo-pilosa tibiis anticis bidentatis, dente apicali elongato, articulis duobus primis tarsorum posteriorum longitudine subaequalibus. — Long. 8,5 mm.

Matto grosso (Corumba).

Philochlaenia cayennensis n. sp.

♂. *Ph. viridimicanti* Mos. similis, minor. Fusca, supra opaca, plus minusve viridi-micans, sparsim flavo-griseo-setosa, subtus nitida. Capite, fronte mediocriter crebre, clypeo paulo densius punctato, clypei margine antico reflexo, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis testaceis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine subaequali; prothorace transverso, lateribus fortiter curvatis angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso irregulariter setis adpressis vestito, plægis nonnullis laevibus, glabris; scutello parce punctato; elytris sparsim punctis setosis obtectis, costis indistinctis; pygidio umbilicato-punctato, punctis setas ferentibus. Subtus dense punctata, punctis griseo-pilosis; tibiis anticis bidentatis, tarsis posticis articulo primo secundo duplo longiore. — Long. 6,5—7 mm.

Cayenne (Kourou Fl., Maroni). coll. Ohaus.

Kleiner als *Ph. viridimicans* Mos., die Beborstung der Oberseite weitläufig, das Halsschild mit glatten Stellen, die Vorder-schienen zweizählig.

Philochlaenia rugiceps n. sp.

♂. *Ph. emarginatae* Mos. similis. Fusca, nitida, breviter griseo-pilosa. Capite rugoso-punctato, fronte sparsim setosa, clypeo antrorsum angustato, margine antico profunde sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis ferrugineis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso dense sat fortiter umbilicato-punctato,

punctis pilis recumbentibus vestitis; scutello confertim pilifero-punctato; elytris subrugosis, dense punctatis, punctis breviter pilosis, elytris singulis quadricostatis, costis duabus externis obsoletis; pygidio creberrime umbilicato-punctato, punctis pilosis. Subtus ubique dense pilifero-punctata, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum elongato. — Long. 8 mm.

Brasilia (Rio Janeiro).

Die Art unterscheidet sich von *emarginata* Mos. durch den runzelig punktierten Kopf, schwächer gerunzelte Flügeldecken, schlankere Hinterschienen und schwächere Beborstung des ersten Gliedes der Hintertarsen.

Philochlaenia excisiceps n. sp.

♂. Oblonga, postice paulo ampliata, fusca, subopaca, griseo-setosa. Capite dense rugoso-punctato, punctis flavo-griseo-setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, profunde exciso; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite multo brevioribus; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre subrugoso-punctato, punctis setis recumbentibus vestitis; scutello dense setifero-punctato; elytris crebre punctatis, punctis setis parvis adpressis instructis, costis parum elevatis, setis validioribus erectis ornatis; pygidio dense annulato-punctato, punctis setis erectis vestitis. Subtus confertim setifero-punctata, tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posticorum valde elongato. — Long. 8—9 mm.

Cayenne.

Philochlaenia boliviensis n. sp.

Oblongo-ovalis, rufo-fusca, subnitida, supra parce, subtus densius griseo-pilosa. Capite, fronte dense subrugoso-punctata, punctis setosis, clypeo sparsim punctato, antrorsum angustato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali, flabello feminae stipite brevioribus; prothorace transverso, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis pilis adpressis instructis; scutello confertim pilifero-punctato; elytris dense subrugoso-punctatis, punctis pilis brevibus setiformibus vestitis, elytris singulis quadricostatis, costis setis longioribus ornatis, callo apicali fasciculato; pygidio crebre annulato-punctato, punctis setoso-pilosis. Subtus dense punctata, punctis pilis adpressis instructis; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo fere duplo longiore. — Long. 8—9 mm.

Bolivia (St. Cruz). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Philochlaenia sarana n. sp.

♂. *Ph. duplosetosae* Mos. similis, sed setis tenuioribus. Fusca, subnitida, griseo-setosa. Capite leviter rugoso, annulato-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, sat profunde sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipitis articulis 5 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, post medium rotundato-dilatato, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, dorso sat dense punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello setifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis setis brevibus adpressis instructis, elytris singulis quadricostatis, costis setis paulo longioribus sed haud erectis ornatis, callo apicali fasciculato; pygidio crebre annulato-punctato, punctis setosis, setis nonnullis ante pygidii apicem longioribus, erectis. Subtus dense cinereo-pilosa, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posteriorum secundo multo longiore. — Long. 10 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Philochlaenia variipennis n. sp.

Ex affinitate *Ph. sordidae* Burm., minor. Fusca, supra subopaca, griseo-setosa. Capite dense punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali, flabello feminae multo brevioris; prothorace transverso, medio rotundato-dilatato, angulis anticis rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso mediocriter crebre et irregulariter setis griseis adpressis vestito; scutello dense setifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, mediocriter dense setis brevibus adpressis oblectis, costis maculis glabris setisque rigidioribus albis ornatis, callo apicali albo-fasciculato; pygidio dense annulato-punctato, punctis setosis. Subtus confertim punctata, punctis pilis griseis vestitis, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo duplo longiore. — Long. 8,5 mm.

Brasilia. Beske leg. Mus. Berol.

Philochlaenia ornatipennis n. sp.

♂. Praecedenti similis. Fusca, supra opaca, subtus nitida, griseo-setosa. Capite, fronte irregulariter setifero-punctata, clypeo subrugoso-punctato, antrorsum angustato, margine antico elevato, sat profunde sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello fusco, in mare stipiti longitudine aequali; prothorace postice fere duplo latiore quam longiore,

medio rotundato-dilatato, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso medio parce, ad latera versus densius pilis griseis adpressis vestito; scutello juxta latera setifero-punctato; elytris breviter griseo-setosis, costis maculis setosis et setam majorem ferentibus maculisque glabris ornatis, callo apicali maculaque utrinque juxta scutellum densius setosis; pygidio medio-criter crebre setoso, macula media glabra. Subtus dense punctata, punctis cinereo-pilosis, tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum posticorum secundo dimidia parte longiore. — Long. 8 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Ein oberseits glänzendes ♀ mit etwas grünlichem Metallschimmer scheint zu dieser Art zu gehören.

Corminus testaceipennis n. sp.

♂. Niger, nitidus, griseo-setosus, antennis elytrisque testaceis. Capite, fronte scabrosa, setosa, clypeo remote fortiter punctato, antrorsum angustato, margine antico reflexo, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis 10-articulatis, articulis 2.—5. flabelloque elongatis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis setis suberectis vestitis; scutello setifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis setis adpressis vestitis, elytris singulis obsolete tricostatis, setis nonnullis longioribus juxta suturam erectis; pygidio umbilicato-punctato, punctis setas ferentibus. Subtus dense punctatus, punctis setosis; tibiis anticis maris bidentatis. — Long. 8 mm.

Brasilia (Minas Geraes).

Corminus varians n. sp.

♂. Oblongus, nigro-aeneus, cupreo-vel viridi-micans, elytris interdum fulvis. Capite, fronte scabroso-punctata, punctis setosis, clypeo parce punctato, margine antico valde reflexo, sinuato; antennis 10-articulatis, stipite testaceo, flabello nigro, in mare stipitis articulis 5 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso medio-criter crebre sat fortiter punctato, punctis pilis griseis erectis vestitis; scutello setifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis pilis griseis recumbentibus ornatis, costis obsolete; pygidio dense annulato-punctato, punctis pilosis. Subtus crebre pilifero-punctatus, tibiis anticis tridentatis, dente primo in mare minuto; articulo primo tarsorum posticorum secundo perparum longiore. — Long. 8 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Corminus guayaquilanus n. sp.

♂. Oblongus, rufo-testaceus, nitidus, griseo-pilosus. Capite rugoso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum paulo angustato, margine antico reflexo, leviter sinuato; antennis gracilibus, rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 6 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter crebre punctato, punctis pilis adpressis vestitis; scutello dense pilifero-punctato, elytris singulis quadricostatis, subrugoso-punctatis, elytrorum pilis recumbentibus; pygidio umbilicato-punctato, punctis pilosis. Subtus crebre pilifero-punctatus, tibiis anticis tridentatis, tarsis gracilibus, tarsis posticis articulo primo secundo duplo longiore. — Long. 10 mm.

Ecuador (Guayaquil). v. Buchwald leg. Mus. Hamburg.

Anomalonyx n. gen.

Gen. *Philochlaeniae* Burm. affinis, differt antennis 8-articulatis, unguibus apice inaequaliter fissis, altero dente divisione apicali brevior, altero multo longiore.

Anomalonyx uruguayensis n. sp.

Oblongus, rufo-fulvus, nitidus, flavo-griseo-pilosus. Capite dense scabroso-punctato, punctis longe setosis, clypeo rotundato, margine reflexo; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, stipitis articulis tertio quartoque elongatis, quinto spinoso, flabello maris articulis 3.—5. conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense aciculato-punctato, punctis pilis longis recumbentibus vestitis; scutello crebre pilifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, mediocriter dense pilis brevioribus fere adpressis obtectis, basi longius-pilosa; pygidio subtiliter punctato, punctis pilis longis erectis instructis. Subtus crebre flavido-pilosus, pedibus sat crassis, tibiis anticis bidentatis, articulo basali tarsorum posticorum secundo duplo longiore. — Long. 11,5—12 mm.

Uruguay (Dolores). Mus. Berol.

Demodema paraguayensis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, nigro-fusca, nitida, elytris abdomineque rufo-fuscis, supra sat remote griseo-setosa. Capite rugoso-punctato, fronte setosa, clypeo rotundato, paulo producto; antennis testaceis, 8-articulatis, flabello maris 3-articulato, articulis 4 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et

posticis obtusis, dorso sat crebre aciculato-punctato, punctis setis brevibus adpressis instructis, setis nonnullis longioribus erectis; scutello confertim setifero-punctato; elytris leviter rugosis, sat remote setis adpressis vestitis, obsolete costatis; pygidio alutaceo, sat dense punctato, punctorum setis adpressis, setis nonnullis longioribus ante pygidii apicem erectis. Subtus cinereo-setosa, tibiis anticis bidentatis, tarsis posticis articulo primo secundo parum modo longiore. — Long. 9 mm.

Paraguay (Asuncion). coll. Ohaus.

Isonychus peruanus n. sp.

♂. *I. arbusticolae* Er. similis, praecipue differt elytrorum costis alternis latioribus et minus convexis. Fuscus, griseo-pilosus. Capite, fronte granuloso-punctata, punctis pilis adpressis vestitis, clypeo erecte piloso, margine antico rotundato; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite paulo brevior; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice fere parallelis, antice incurvatis, angulis anticis productis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso crebre punctato, punctis pilis adpressis instructis; scutello confertim pilifero-punctato; elytris seriatis, interstitiis dense punctatis, punctis pilosis, pilis griseis adpressis, maculis nonnullis indistinctis dilutioribus, interstitiis alternis latioribus, paulo convexioribus; pygidio dense pilifero-punctato, basi, medio excepto, nigro-fusca. Subtus crebre punctatus, punctis pilis adpressis griseis ornatis, segmento ultimo in mare punctis nonnullis modo oblecto. — Long. 11 mm.

Peru (Chanchamayo).

Isonychus submaculatus n. sp.

♂. Praecedenti similis, minor, prothoracis lateribus postice paulo divergentibus. Nigro-fuscus, pilis griseis adpressis vestitus. Capite, fronte sat dense pilifero-punctata, clypeo erecte piloso, margine antico late rotundato; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso crebre punctato, punctis griseo-pilosis; scutello dense pilifero-punctato; elytris striatis, interstitiis crebre punctis pilosis griseis oblectis, maculis nonnullis dilutioribus vel obscurioribus, interstitiis alternis latioribus et paulo convexioribus; pygidio confertim umbilicato-punctato, punctis pilosis, basi, medio excepto, nigra. Subtus dense punctatus, punctis cinereo-pilosis, segmento ultimo maris medio sparsius punctato. — Long. 9 mm.

Brasilia (Espirito Santo).

Isonychus ornatipennis n. sp.

I. impluviato Burm. similis, sed multo minor. Ovals, nigro-fuscus, paulo aeneo-micans, griseo-pilosus. Capite, fronte granuloso-punctata, punctis pilis adpressis vestitis, clypeo erecte piloso, margine antico rotundato; antennis fulvis, flabello in utroque sexu sat parvo; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice parallelis, antice incurvatis, angulis anticis acutis, parum porrectis, angulis posticis obtusis, prothoracis dorso scutelloque dense pilifero-punctatis; elytris striatis, griseo-pilosis, fascia antemedialia, fascia media, utrinque abbreviata fasciaque postmedia obscuris, interstitiis alternis latioribus et parum convexioribus; pygidio umbilicato-punctato, punctis pilis griseis adpressis vestitis. Subtus dense griseo-pilosus, segmento penultimo maris medio granulato. — Long. 5,5–6 mm.

Brasilia (Jatahy).

Isonychus oblongomaculatus n. sp.

Ovals, nigro-fuscus, pilis griseis adpressis vestitis. Capite, fronte scabroso-punctata, punctis pilosis, clypeo erecte piloso, margine antico rotundato; antennis rufo-flavis, flabello maris stipiti longitudine aequali, flabello feminae brevioris; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice fere parallelis antice incurvatis, angulis anticis paulo acutis et paulo productis, angulis posticis obtusis, dorso scutelloque crebre pilifero-punctatis; elytris striatis, dense griseo-pilosis, plus minusve maculis obscuris instructis, interstitiis fere planis, alternis angustioribus et maculis oblongis pallidioribus ornatis; pygidio confertim griseo-piloso. Corpore infra pilis griseis obtecto. — Long. 5 mm.

Matto grosso (Corumba).

Isonychus albosignatus n. sp.

♂. Ovatus, rufo-fuscus, paulo aenescens, griseo-pilosus. Capite, fronte mediocriter crebre punctata, punctis pilis adpressis vestitis, clypeo erecte piloso, margine antico rotundato; antennis stipite fulvo, flabello piceo; prothorace latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis, paulo productis, angulis posticis obtusis, dorso scutelloque dense subtiliter punctatis, punctis pilis adpressis instructis; elytris striatis, sat dense punctis subtilibus pilosis obtectis, fasciis duabus submedianis, lateraliter conjunctis, densius pilosis, interstitiis planis, alternis latioribus, interstitio secundo angusto maculis duabus oblongis albis ornato; pygidio dense flavo-griseo-piloso, basi ochraceo-maculata. Subtus crebre pilifero-punctatus. — Long. 6,5 mm.

Amazonas. Von Dr. O. Staudinger und A. Bang-Haas erhalten.

Isonychus cervinus Er. = (*abdominalis* Mos.).

Obgleich Erichson die Art nach einem ♂ beschrieben hat, erwähnt er in seiner flüchtigen Beschreibung nicht die Charakteristik des Abdomens.

Isonychus ventralis n. sp.

Ovatus, rufo-fuscus, dense flavo-cinereo- vel cinereo-pilosus. Capite, fronte dense pilosa, clypeo parce erecte piloso, margine antico late rotundato; antennis ferrugineis; prothorace latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus leviter curvatis, angulis anticis paulo acutis, angulis posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis pilosis; elytris striatis, dense pilosis, interstitiis alternis angustioribus, interstitio secundo angusto maculis nonnullis indistinctis pallidioribus instructo; pygidio maculis duabus fuscis, postice convergentibus ornato. Subtus dense pilosus, abdominis segmento penultimo in mare postice medio triangulariter retrorsum lobato, segmento ultimo medio antice triangulariter exciso, utrinque juxta medium macula fusca ornato; abdominis segmento penultimo in femina haud lobato, segmento ultimo nec exciso, nec maculato; pedibus rufis, pilosis. — Long. 6,5 mm.

Para. Mus. Berol.

Isonychus parvus n. sp.

Oblongo-ovalis, fuscus, griseo-pilosus. Capite, fronte setis adpressis oblecta, clypeo erecte setoso, margine antico rotundato; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis paulo productis, acutis, angulis posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis griseo-pilosis; scutello crebre pilifero-punctato; elytris striatis, griseo-pilosis, maculis nonnullis irregularibus obscurioribus, interstitiis alternis latioribus et paulo convexis; pygidio dense griseo-piloso, maculis duabus basalibus semiannulatis ochraceis, margine postico paulo reflexo. Subtus crebre cinereo-pilosus. — Long. 9 mm.

Para. Mus. Berol.

Isonychus fuscomaculatus n. sp.

♂. *I. maculipenni* Mos. similis, major, prothorace postice latiore. Fuscus, cinereo-pilosus, elytris fusco-maculatis. Capite, fronte setosa, clypeo nitido, margine antico late rotundato; antennis rufo-flavis, flabello paulo obscuriore; prothorace latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso dense cinereo-piloso; scutello cinereo; elytris striatis, cinereo-pilosis,

irregulariter fusco-maculatis, interstitiis alternis latioribus et paulo convexis, interstitiis angustis maculis oblongis indistincte pallidioribus ornatis; pygidio cinereo, nigro-fusco-bimaculato. Subtus dense cinereo-pilosus, abdominis segmento ultimo in mare medio fere glabro. — Long. 6 mm.

Brasilia (Sao João d'El Rey). Mus. Berol.

Isonychus sulcicollis n. sp.

Rufo-fuscus, subtus cinereo-, supra ♂ flavo-ochraceo-, ♀ flavido-pilosus. Capite, fronte setis adpressis oblecta, clypeo erecte setoso, margine antico truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufis, flabello nigro; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice fere parallelis, antice incurvatis, angulis anticis paulo acutis, angulis posticis obtusis, dorso crebre piloso, lateribus in mare dilutioribus, medio longitudinaliter leviter sulcato; scutello dense piloso; elytris crebre pilosis, striatis, interstitiis alternis latioribus et paulo convexis, in mare parte basali et interstitio secundo angusto interdum dilutioribus; pygidio flavido-vel griseo-piloso, immaculato. Subtus cinereo-pilosus, abdominis segmento penultimo in mare medio macula granulata fusca ornato. — Long. 7 mm.

Brasilia (Soa João d'El Rey). Mus. Berol.

Isonychus griseolus n. sp.

♂. Ovalis, rufo-fuscus, pilis griseis adpressis vestitus. Capite, fronte pilis adpressis, clypeo pilis erectis vestito, clypei margine antico late rotundato; antennis testaceis; prothorace latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis griseo-pilosis; scutello crebre pilifero-punctato; elytris striatis, pilis griseis oblectis, maculis indistinctis obscurioribus ornatis, interstitiis alternis parum latioribus et paulo convexis; pygidio griseo-piloso, basi interdum nigro-fusco-bimaculato. Subtus cinereo-pilosus, abdominis segmento penultimo medio granulato et fusco-setoso, segmento ultimo laevi; pedibus rufo-testaceis. — Long. 5,5—6 mm.

Amazonas (Para).

Isonychus Zikani n. sp.

Oblongo-ovalis, niger, griseo-setosus, antennis tarsisque testaceis. Capite, fronte crebre punctata, punctis setis adpressis vestitis, clypeo erecte setoso, antrorsum angustato, margine antico elevato, late rotundato; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, post medium leviter sinuatis, angulis anticis fere rectangularibus, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso

dense punctato, punctis setis adpressis instructis; scutello crebre setifero-punctato; elytris striatis, interstitiis dense punctatis, punctis setis adpressis ornatis, interstitiis alternis paulo latioribus et convexioribus; pygidio crebre cinereo-squamoso-setoso, macula basali triangulari nigro., maculam cineream includente. Subtus cinereo-setosus, abdominis segmento ultimo in utroque sexu sat longo, fere laevi. — Long. 6 mm.

Minas Geraes. Zikan leg.

Von den 3 vorliegenden Exemplaren sind bei den beiden ♀♀ die Flügeldecken gleichmäßig mit grauen schuppenartigen Borsten besetzt, beim einzigen ♂ erscheinen die Flügeldecken infolge des Auftretens dunkler Borsten scheckig und es markieren sich hinter der Mitte 2 helle, seitlich miteinander verbundene Querbinden. Das letzte Bauchsegment ist in beiden Geschlechtern ziemlich lang, das vorletzte Segment zeigt beim ♂ keine besondere Geschlechtsauszeichnung.

Isonychus flavopilosus n. sp.

Oblongo-ovalis, fuscus vel nigro-fuscus, ubique flavido-pilosus. Capite aciculato-punctato, fronte dense, clypeo parce piloso, clypei margine antico levissime sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis nigris; prothorace postice latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus leviter curvatis, angulis anticis paulo acutis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso dense punctato, punctis pilis recumbentibus instructis, pilis suberectis intermixtis; scutello confertim pilifero-punctato; elytris crebre pilis adpressis obtectis, pilis nonnullis juxta elytrorum suturam suberectis, costis obsolete; pygidio dense aciculato-punctato, punctis pilosis. Subtus crebre pilosus, abdominis segmento quinto maris macula media fere nuda instructo. — Long. 9—12 mm.

Ecuador (Macao).

Isonychus fulvipennis n. sp.

Praecedenti similis, major. Oblongo-ovalis, niger, elytris pectoreque fulvis, ubique flavo-setosus. Capite, fronte dense aciculato-punctata, punctis flavo-setosis, clypeo setis erectis nigro-fuscis instructo, antrorsum angustato, margine antico truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, flabello obscuriore; prothorace transverso, medio paulo rotundato-dilatato, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis rotundatis, dorso crebre punctato, punctis setis flavis adpressis vestitis; scutello dense setifero-punctato; elytris striatis, interstitiis planis, setis adpressis obtectis, setis erectis intermixtis; pygidio crebre setifero-punctato, setis flavis adpressis, setis nonnullis obscurioribus erectis.

Subtus confertim punctatus et flavo-griseo-setosus, metasterni setis flavidis. — Long. 13—14 mm.

Ecuador (Sarayacu, Archidona). coll. Ohaus.

Isonychus griseopilosus n. sp.

Statura *I. grisei* Mann. Nigro-fuscus vel fuscus, aenescens, pilis griseis adpressis vestitus. Capite, fronte aciculato-punctata, punctis setis adpressis instructis, clypeo nitido, erecte piloso, margine antico paulo elevato, truncato vel subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice fere parallelis, antice incurvatis, angulis anticis rectangulis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso crebre punctato, punctorum setis adpressis; scutello confertim setifero-punctato; elytris striatis, dense punctatis, punctis setis adpressis vestitis, interstitiis alternis latioribus et convexioribus, interstitio secundo angusto, macula parva media dilutiore ornato; propygidio pygidioque crebre albido-squamoso-setosis, pygidio maculis duabus basalibus obscuris, juxta medium positis, instructo. Subtus setis adpressis griseis vestitus, abdominis segmento quinto in mare granulato, tarsis, interdum etiam tibiis femoribusque rufo-fuscis. — Long. 7 mm.

Brasilia (Espírito Santo, C. S. Leopoldina). coll. Ohaus.

Die Art ist mit anliegenden grauen Haarborsten bekleidet, doch wird der Untergrund nicht ganz verdeckt und die Zwischenräume der Flügeldecken sind abwechselnd breit und schmal, der zweite Zwischenraum zeigt bei einigen Stücken in der Mitte einen kleinen helleren Fleck.

Isonychus oblongoguttatus n. sp.

♂. Breviter ovalis, nigro-fuscus, antennis tarsisque rufo-fuscis. Capite, fronte dense-punctata, punctis setis griseis instructis, clypeo granulato, erecte setoso, margine antico truncato, angulis anticis rotundatis; prothorace transverso, lateribus postice rectis, antice incurvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis setis adpressis griseis vel flavidis vestitis, setis maculas nonnullas indistinctas formantibus; scutello dense setifero-punctato; elytris striatis, interstitiis crebre punctatis, punctis griseo- vel flavido-setosis, setis obscurioribus intermixtis, interstitiis alternis latioribus et convexioribus, interstitiis angustis maculis oblongis albidis vel flavidis ornatis; pygidio dense setis griseis, flavidis et nigris oblecto. Subtus griseo-piloso-setosus, abdominis segmento ultimo in mare fere laevi, nitido. — Long. 7 mm.

Brasilia (Mar. S. Espanha, J. Zikan leg., Minas Geraes). coll. Ohaus.

Isonychus tenuivestis n. sp.

I. albicincto Mann. simillimus, differt statura paulo minore, pilis tenuioribus et brevioribus. — Long. 9 mm.

Argentina (Cordoba, Mendoza, San Luis.). C. Bruch leg. coll. Ohaus.

Wahrscheinlich nur eine Lokalform von *I. albicinctus* Mann., wenn auch der Forceps ein wenig abweichend gebildet ist. Die Behaarung der Ober- und Unterseite ist viel feiner und kürzer, so daß der Untergrund stärker hervortritt und die Art glänzender erscheint.

Isonychus nitens n. sp.

I. nitido Burm. similis, minor. Fulvus, nitidus, capite, prothorace scutelloque rufo-cupreis, plus minusve viridescentibus, corpore infra interdum cupreo Capite, fronte aciculato-punctata, punctis flavido-setosis, clypeo granulato, margine antico subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, flabello nigro-fusco; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice parallelis, antice incurvatis, dorso sat remote punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello dense punctato; elytris striatis, striis ad elytrorum latera versus punctatis, interstitiis paulo convexis, sparsissime subtiliter punctatis, punctis setosis; pygidio medio-criter crebre umbilicato-punctato, punctis setas ferentibus. Subtus sparsim punctatus, punctis juxta abdominis latera setosis, abdominis segmento penultimo in mare antice late impresso. — Long. 6 mm.

Peru (Chanchamayo).

Dem *I. nitidus* Burm. ähnlich, kleiner, die Streifen der Flügeldecken nach den Seiten zu in Punkte aufgelöst, die Zwischenräume viel weitläufiger punktiert.

Isonychus Ohausi n. sp.

Ovalis, rufo-fuscus an nigro-fuscus, griseo- vel flavo-griseo-setosus. Capite granuloso-punctato, punctis setosis, clypei margine antico late rotundato; antennis rufo-flavis, flabello nigro-fusco; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice parallelis, antice incurvatis, dorso crebre aciculato-punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello dense setifero-punctato, setis dilutioribus; elytris striatis, interstitiis alternis latioribus et paulo convexis, aciculato-punctatis, punctis setosis, setis adpressis; pygidio umbilicato-punctato, punctis setis instructis. Subtus griseo-piloso-setosus. — Long. 3—4 mm.

Ecuador (Bucay). Dr. F. Ohaus leg. VI.—VII. 1905.

Die Oberfläche ist anliegend beborstet, so daß der Untergrund nicht verdeckt wird. Beim ♂ sind die Borsten etwas kräftiger. Einige männliche Exemplare tragen auf der Oberseite auch dunklere Borsten und zeigen diese Exemplare auf dem Halschilde eine helle mittlere und jederseits eine seitliche Binde, während die Flügeldecken heller längsgestreift sind. Ein ♂ ist ganz schwarz mit hellem Schildchen.

Isonychus nigripes n. sp.

♂. *I. suturalis* Mann. simillimus, praecipue differt pedibus nigris, haud vel sparsissime squamosis. — Long. 5,5 mm.
Brasilia.

Die Art ist dem sehr variablen *I. suturalis* Mann. täuschend ähnlich und wird wohl in gleicher Weise variieren. Sie unterscheidet sich am leichtesten dadurch, daß die Beine schwarz sind und entweder keine oder nur ganz vereinzelt Schüppchen tragen, während die Beine bei *suturalis* mehr oder weniger braun und beschuppt sind. Die Forcipes beider Arten sind sehr verschieden voneinander.

Isonychus limbatus Burm.

Die Art liegt mir aus der coll. Ohaus von Sao Paulo, Rio de Janeiro und Novo Friburgo vor und ist der Fundort Mexico wohl sicher falsch. Die Art ist durch einen Buckel auf dem Pygidium des ♀ ausgezeichnet. Sie variiert ebenso wie *suturalis* Mann. und sind goldgelbe-Exemplare von Burmeister als *aurantiacus* beschrieben.

Isonychus Kuntzeni n. sp.

♀. Ovatus, rufo- vel nigro-fuscus, supra ochraceo- vel fusco-squamosus, albo- vel flavido-maculatus. Capite, fronte dense flavido-squamosa, clypeo erecte setoso, margine antico subtruncato, angulis anticis rotundatis; antennis testaceis, flabello nigro; prothorace latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso dense squamis angustis flavidis oblecto, disci medio obscuriore; scutello ochraceo-squamoso; elytris crebre squamulatis, squamis ochraceis vel fuscis, elytris singulis 5 albo- vel flavido-maculatis, annulo remiformi antemediano annuloque postmediano obscurioribus ornatis; pygidio corporeque infra confertim albo- vel flavo-squamosis; pedibus rufis, squamosis. — Long. 9 mm.
Ecuador (Santa Inéz). R. Haensch leg. Mus. Berol.

Isonychus vittipennis n. sp.

Parvus, niger, nigro- et albido-squamoso-setosus. Capite rugoso-punctato, punctis albido-setosis, clypeo margine antico

rotundato; antennis nigro-fuscis; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso albido-setoso, setis in disci medio nigro-fuscis; scutello dense setis albidis obtecto; elytris singulis, vittis 5 albidis ornatis, interstitiis nigris vel fuscis; propygidio dense, pygidio sat remote albo-squamosis. Subtus albido-setosus, pedibus nigris vel rufis. — Long. 4,5 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Isonychus flaviventris n. sp.

Parvus, ovatus, densissime squamosus. Capite, fronte fusco-squamosa, clypeo nitido, apice late rotundato; antennis fulvis, flabello nigro; prothorace latiore quam longiore, medio angulatim dilatato, angulis anticis acutis, angulis posticis obtusis, dorso dense nigro-fusco-squamulato, fascia lata basali albida; scutello nigro, squamis nonnullis pallidis; elytris nigris, singulis vittis 5 albidis ornatis, interstitio primo, medio macula albida instructo, vittis interdum absentibus; pygidio confertim albido-squamoso. Subtus pectore albo-, abdomine flavo-squamosus, abdominis segmento quinto apice bilobato, lobis fulvis, setosis, femoribus tibiisque nigris, squamis albis vestitis, tarsis fuscis. — Long. 4,5 mm.

Ecuador (Santa Inéz). R. Haensch leg. Mus. Berol.

Gastrohoplus n. gen.

Gen. *Schizochelo* Blanch. affinis differt prothorace longiore, propygidio maris valde elongato, abdomine concavo, segmento penultimo utrinque juxta medium spina longissima (abdomini longitudini aequali), leviter curvata, armato.

Gastrohoplus mirabilis n. sp.

♂. Oblongus, postice paulo attenuatus, nigro-fuscus, clypeo, prothoracis lateribus, elytris, femoribus tibiisque in dimidia parte basali brunneis. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis testaceis, 9-articulatis, flabello piceo, in mare stipite paulo brevior; prothorace longiore quam latiore, antrorsum parum angustato, basi lateribusque leviter bisinuatis, angulis anticis et posticis acutis, dorso longitudinaliter leviter sulcato, dense punctato, punctis brunneo-setosis, vitta media, postice dilatata, nigro-setosa, sulco setis griseis ornato; scutello flavo-griseo-piloso; elytris alutaceis, sat dense pilis adpressis flavidis obtectis, seriato-punctatis, interstitiis alternis latioribus et paulo convexioribus; propygidio fortiter elongato, aciculato-punctato, punctis griseo-setosis; pygidio in dimidia parte poste-

riore rufo, antice nigro, erecte nigro-fusco-piloso et vitta angusta media griseo-setosa ornato. Subtus pectore abdomineque lateribus dense cinereo-pilosis, abdomine medio concavo, alutaceo, glabro, segmento penultimo juxta latera spina longissima brunnea instructo; pedibus gracilibus, tibiis anticis maris inermibus, tarsis nigro-fuscis, articulo primo tarsorum anticorum apice intus spina sat longa curvata armato; tarsis mediis pilis longis brunneis erectis ornatis, tarsis posticis brevius pilosis, articulis singulis apice spinis nonnullis brunneis instructis; unguibus brunneis, apice fissis et dente juxtabasali armatis. — Long. 11 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Macroductylus paraguayensis n. sp.

M. subspinosa Fab. similis, minor. Fuscus, supra dense flavo-squamoso-pilosus, clypeo, antennis, flabelli apice piceo excepto, pedibusque rufis. — Long. 6,5—7 mm.

Paraguay. Dr. Bohls leg. coll. Ohaus.

Die Art ist dem *M. subspinosa* Fab. ähnlich, etwas kleiner, die Schuppenhaare der Oberseite sind gelber, stehen noch dichter, so daß der Untergrund völlig verdeckt wird, und sind etwas mehr schuppenartig. Auch mit *M. pumilo* Burm. hat die Art große Ähnlichkeit, doch ist sie etwas schmaler und unterscheidet sich durch die kürzeren und kräftigeren schuppenartigen Haare der Oberseite.

Macroductylus bicolor n. sp.

♂. Nigro-aeneus, clypeo, antennis, elytris, femoribus tibiisque rufis, tarsis nigro-fuscis, supra et subtus griseo-squamoso-setosus. Capite dense punctato, clypeo antrorsum paulo angustato, margine antico truncato, angulis anticis rotundatis; prothorace longiore quam latiore, ante medium angulatim dilatato, lateribus postice sinuatis, dorso confertim punctato, postice levissime sulcato; elytris seriatis, interstitiis leviter convexis, creberrime subtiliter punctatis; pygidio leviter alutaceo, haud dense punctato, punctis setosis; abdomine maris utrinque juxta medium setis validis instructo. — Long. 8 mm.

Brasilia (Curytiba).

Plectris Ohausi n. sp.

♂. Oblonga, rufa, nitida, parce flavido-pilosa. Capite scabropunctato, flavo-piloso, clypeo rotundato, margine reflexo, integro; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, flabello maris stipite brevior; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense aciculato-punctato, punctis pilis adpressis instructis; scutello crebre pilifero-punctato; elytris

subrugoso-punctatis, sparsim pilis recumbentibus vestitis, subcostatis; pygidio medio sat remote, juxta latera densius punctato, erecte piloso. Subtus pectore dense et longe flavido-piloso, abdomine sat crebre pilifero-punctato; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo fere duplo longiore. — Long. 13 mm.

Argentina (Buenos Aires). C. Bruch leg. coll. Ohaus.

Plectris fuscoaenea n. sp.

Oblongo-ovalis, aeneo-fusca, griseo-pilosa. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, clypeo margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennis testaceis, 8-articulatis, stipitis articulis tertio quartoque elongatis, flabello maris stipite paulo brevior, flabello feminae articulis 4 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso levissime rugoso, mediocriter crebre sat fortiter punctato, punctis pilosis; scutello dense pilifero-punctato, macula media basali laevi; elytris singulis quadricostatis, subrugoso-punctatis, punctis pilis adpressis vestitis, pilis nonnullis erectis; pygidio dense umbilicato-punctato, punctis pilosis. Subtus confertim pilifero-punctata, tibiis anticis, bidentatis, tarsis posticis articulo basali fortiter elongato. — Long. 13 mm.

Brasilia (Novo Friburgo). F. Wiengreen leg. Mus. Hamburg.

Plectris griseovestita n. sp.

♂. Nigro-fusca, nitida, griseo-piloso-setosa, tarsis fuscis. Capite, fronte scabroso-punctata, punctis setosis, clypeo sat longo, fortiter punctato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 8-articulatis, stipitis articulis tertio quartoque fortiter elongatis, flabello maris stipite paulo brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello crebre setifero-punctato; elytris dense aciculato-punctatis, punctis setosis, setis adpressis, setis nonnullis erectis, elytris singulis quadricostatis; pygidio confertim umbilicato-punctato, punctis setis adpressis instructis, setis sparsis ante pygidii apicem erectis. Subtus ubique setifero-punctata, setis piliformibus; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 9,5 mm.

Misiones. coll. Ohaus.

Plectris grisea n. sp.

♂. Fusca, nitida, capite, prothorace pedibusque nigro-fuscis, griseo-setosa. Capite dense scabroso-punctato, punctis setosis,

clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis testaceis, 8-articulatis, flabello maris stipite paulo brevior; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, his subrotundatis, dorso crebre punctato, punctis setis adpressis vestitis, setis nonnullis erectis intermixtis; scutello dense setifero-punctato; elytris scabroso-punctatis, punctis setis adpressis instructis, setis erectis seriatim positis, costis paulo convexis; pygidio crebre annulato-punctato, punctis setosis, macula parva postmedia interdum laevi. Subtus dense punctata, punctis setosis, tibiis anticis tridentatis, dente primo obsoleto, tarsis posticis articulo primo secundo multo longiore. — Long. 7,5 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Plectris podicalis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, nigra, albo-squamoso-setosa. Capite dense punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite multo brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis setosis; scutello confertim setifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, mediocriter dense setis adpressis vestitis; pygidio crebre annulato-punctato, punctis squamis angustis ornatis. Subtus pectore albido-setoso, abdomine albo-squamoso, medio setis erectis ornato, segmento ultimo dense flavido-piloso; tibiis anticis tridentatis, dente primo obsoleto, tarsis crassis, articulo primo tarsorum posteriorum secundo duplo longiore. — Long. 9—10 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Plectris Kuntzeni n. sp.

Oblongo-ovalis, nigra, nitida, antennis, elytris, abdomine tarsisque rufo-testaceis, albido-setosa. Capite scabroso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico in mare elevato, truncato, in femina late rotundato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu stipite brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis setis recumbentibus vestitis; scutello crebre setifero-punctato; elytris scabroso-punctatis, punctis setis adpressis ornatis, costis obsoletis; pygidio medio sparsissime, post marginem anticum et juxta latera sat dense punctato, punctis setis adpressis instructis. Subtus crebre cinereo-piloso-setosa, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo basali secundo dimidia parte longiore. — Long. 8 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Plectris corumbana n. sp.

♂. Oblonga, nigro-fusca, squamis angustis albis vestita. Capite dense granuloso-punctato, punctis setosis, clypeo margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, prothoracis dorso, scutello elytrisque crebre aciculato-punctatis, punctis squamosis, elytris obsolete costatis; pygidio umbilicato-punctato, punctis squamis instructis. Subtus dense squamoso-setosa, tarsis posticis articulo primo secundo dimidia parte longiore. — Long. 8,5 mm.

Matto grosso (Corumba).

Die Art ist oberseits gleichmäßig mit schmalen weißen Schuppen bekleidet, doch wird der Untergrund nicht verdeckt.

Plectris hamifera n. sp.

♂. Rufa, nitida, elytris fuscis. Capite subrugoso-punctato, clypeo rotundato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite parum brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus ciliatis, post medium sinuatis et leviter crenulatis, dorso remote punctato; scutello laevi; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter rugosis; pygidio mediocriter dense punctato, punctis ante pygidii apicem erecte pilosis. Subtus griseo-pilosa, tibiis anticis tridentatis, dente primo obsolete, articulo primo tarsorum posticorum secundo duplo longiore, tarsis mediis articulo primo apice dente recurvo armatis. — Long. 10 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Rhinaspis Ohausi n. sp.

Oblonga, cupreo-aenea, nitida. Capite, fronte medio laevi, marginibus maculaque media postica punctatis, flavido-setosis, clypeo brevi, angulis anticis rectis, margine antico cornu sat lato, dense setifero-punctato, ornato, cornus lateribus sinuatis, margine antico late rotundato, clypeo feminae grosse punctato, antrorsum parum attenuato, margine antico paulo elevato, sub-sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis fuscis; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, antice et postice levissime sinuatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter dense punctato, medio antico leviter sulcato, in mare plus minusve lobatim producto; scutello punctis nonnullis obtecto; elytris alutaceis, leviter rugosis, haud dense punctatis, sparsim setosis, singulis quadricostatis, costis fere laevibus; pygidio confertim

umbilicato-punctato, punctis breviter erecte pilosis. Subtus dense grisea-pilosa. — Long. 20—23 mm.

Brasilia (St. Catharina, Espirito Santo). coll. Ohaus.

Rhinaspis aeneocuprea n. sp.

♂. *Rh. aeneae* Billb. similis. Aeneo-cuprea, nitida. Capite granuloso-punctato, punctis griseo-setosis, clypeo antrorsum paulo dilatato, angulis anticis acutis, margine antico medio cornuto, cornu apice fortiter dilatato, subtruncato, lateribus profunde sinuatis; antennis fuscis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter crebre punctato, punctis griseo-setosis, medio leviter sulcato; scutello laevi; elytris subrugoso-punctatis, punctis setas ferentibus, elytris singulis quadricostatis, costis setis majoribus instructis; pygidio dense setifero-punctato. Subtus crebre punctata, punctis setis adpressis griseis vestitis. — Long. 20 mm.

Brasilia (Espirito Santo).

Rhinaspis nitidula n. sp.

♂. Viridis, nitida, elytris viridi-fuscis, supra fere glabra, subtus cinereo-pilosa, pedibus cupreis. Capite dense punctato, clypeo antrorsum paulo angustato, margine antico reflexo, late sinuato, clypei parte anteriore cuprea, laxius et fortius punctata; antennis rufo-fuscis; prothorace paulo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato; scutello parce punctato; elytris subrugosis, leviter sulcatis, mediocriter dense punctatis, squamis raris albis angustis vestitis; pygidio confertim squamis oblongis cinereis obtecto. Corpore infra dense piloso, pectoris pilis cinereis, abdominis pilis flavo-griseis; pedibus parce pilosis. — Long. 15 mm.

Brasilia (Sao Paulo). Mus. Berol.

Dicrania Ohausi n. sp.

♂. Ex affinitate *D. nigrae* Serv. Rufo-fusca, nitida. Capite rugoso-punctato, punctis breviter setosis, clypei margine antico bispinoso; antennis rufo-flavis, flabello nigrescente; prothorace lato, antrorsum angustato, lateribus curvatis, dorso laevi, margine laterali externo basique ante scutellum flavido-setosis; scutello dense squamis flavidis obtecto; elytris postice angustatis, laevibus, indistincte seriato-punctatis; pygidio laevi, ante apicem flavo-setoso. Subtus flavido-piloso-setosa, tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum anticorum apice intus dente recurvo armato. — Long. 14—17 mm.

Brasilia (Espirito Santo).

Mit *D. nigra* Serv. verwandt, doch sind der schmale Seitenrand des Halsschildes und das Schildchen beborstet. Von *D. flavo-scutellata* Cast. unterscheidet sich die Art dadurch, daß die Hinterschienen nach dem Ende zu gleichmäßig verbreitert sind und am Ende der gekrümmte Dorn fehlt.

Dicrania notaticollis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, nigra, elytris, pygidio, abdomine, tibiis posticis tarsisque rufis, supra subopaca, subtus nitida. Capite rugoso-punctato punctis flavido-setosis, clypei margine antico truncato, subsinuato, angulis parum acutis; antennis fuscis, articulis duobus primis rufo-flavis; prothorace paulo latiore quam longiore, lateribus curvatis, marginibus lateralibus anticoque flavido-setosis, dorso medio maculis duabus flavido-setosis ornato; scutello confertim flavido-setoso; elytris glabris, indistincte seriato-punctatis; pygidio laevi, apice setoso. Subtus flavo-griseo-pilosa, tibiis posticis apice intus productis, tarsorum anticorum articulis brevibus, crassis, articulo primo apice intus dente recurvo armato. — Long. 10 mm.

Brasilia (Sao Paulo). coll. Ohaus.

Dicrania laevipennis n. sp.

♂. Rufa, nitida. Capite rugoso-punctato, punctis flavido-setosis, clypei margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis breviter rotundatis; antennis rufis; prothorace latiore quam longiore, lateribus post medium parallelis, ante medium incurvatis, dorso medio crebre, ad latera versus laxius et subtilius punctato, punctis nigro-fusco- vel flavido-setosis, prothoracis parte basali lineaque media longitudinali laevibus; scutello linea media excepta, setifero-punctato; elytris laevibus; pygidio alutaceo, umbilicato-punctato, punctis setosis, setis ad pygidii medium versus directis. Corpore infra griseo-piloso-setoso; tibiis anticis bidentatis tibiis posticis apice intus productis, tarsorum anticorum articulis in mare crassis, articulo basali apice intus ampliato, tarsis mediis articulo primo apice intus dente recurvo armato. — Long. 13 mm.

Columbia (R. Meta).

Barybas uniformis n. sp.

Oblongo-ovalis, rufo-fuscus, griseo-squamoso-setosus. Capite scabroso-punctato, punctis setosis, clypei margine antico paulo reflexo, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter crebre, medio paulo sparsius, squamis angustis vestito; scutello

squamifero-punctato; elytris juxta suturam parum impressis, haud dense squamis angustis obtectis, squamis aequalibus; pygidio annulato-punctato, punctis squamoso-setosis. Subtus setis adpressis griseis vestitus, tibiis anticis tridentatis, dente primo minuto, in parte basali plus minusve distincte serratis. — Long. 4,5 mm. Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Barybas fraternus n. sp.

♂. *B. scopifero* Burm. similis. Nigro-fuscus, varioloso-punctatus, griseo-squamosus. Capite dense squamoso, clypeo maris margine antico late rotundato; antennis testaceis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso crebre punctato, irregulariter squamoso, haud sulcato; scutello dense squamifero-punctato; elytris confertim punctatis, irregulariter squamis obtectis, post medium fasciis duabus reductis squamosis ornatis; pygidio crebre annulato-punctato, punctis squamosis. Subtus dense griseo-squamosus, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo multo longiore, tarsis anticis articulo basali elongato, apice intus spinoso. — Long. 6 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Barybas setifer n. sp.

♂. Rufo-fuscus, nitidus, mediocriter crebre albo-setosus. Capite asperato-punctato, punctis setosis, clypeo margine antico reflexo, late rotundato; prothorace sat dense punctato, punctis setis recumbentibus vestitis; scutello setifero-punctato; elytris varioloso-punctatis, mediocriter crebre setis erectis ornatis; pygidio annulato-punctato, punctis setosis. Subtus cinero-setosus, tibiis anticis acute tridentatis, articulo basali tarsorum anticorum elongato, apice intus spinoso, tarsis posticis articulo primo secundo dimidia parte longiore. — Long. 6 mm.

Orinoco. Mus. Berol.

Barybas crassus n. sp.

♂. *B. compacto* Er. similis, brevior, prothorace postice paulo fortius angustato. Fuscus, nitidus, griseo-setosus. Capite dense scabroso-punctato, punctis griseo-setosis, clypei margine antico elevato, late rotundato; antennis testaceis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense varioloso-punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello crebre setifero-punctato; elytris dense varioloso-punctatis, punctis setas adpressas ferentibus; pygidio crebre annulato-punctato, punctis setis instructis, pygidii medio leviter

sulcato. Subtus confertim setifero-punctatus; tibiis anticis tridentatis, dente primo parvo, dentibus duobus inferioribus validis; articulo primo tarsorum anticorum elongato, apice spinoso, tibiis posticis articulo primo secundo paulo longiore. — Long. 8—9 mm.
Bolivia (Yungas de la Paz).

Barybas bituberculatus n. sp.

♀. Oblongus, nigro-fuscus, griseo-squamoso-setosus. Capite dense scabroso-punctato, punctis setosis, clypeo margine antico elevato, late rotundato; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso confertim punctato, punctis setis adpressis instructis; scutello dense setifero-punctato; elytris crebre punctatis, irregulariter setosis, maculis 4 parvis postmedianis callisque apicalibus densius setosis; pygidio creberrime annulato-punctato, ante apicem tuberculis duobus setosis instructo; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum anticorum elongato, apice intus spinoso, tarsis posticis articulo basali secundo longiore. — Long. 7 mm.

Orinoco. Mus. Berol.

Barybas variipennis n. sp.

Fuscus, leviter cuprescens, nitidus, albido-squamosus. Capite asperato-punctato, punctis setosis, clypei margine antico elevato, late rotundato; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, medio fortiter rotundato-dilatato, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis squamis setiformibus vestitis; scutello setifero-punctato; elytris varioloso-punctatis, irregulariter squamis angustis obtectis, maculis numerosis densius squamosis ornatis; pygidio crebre annulato-punctato, punctorum squamis validioribus. Subtus albido-setosus; tibiis anticis tridentatis, articulo basali tarsorum anticorum elongato; tarsis posticis articulo primo secundo fere dimidia parte longiore. — Long. 6—7 mm.

Caracas. Thieme leg. Mus. Berol.

Barybas ferrugineus n. sp.

B. peruano Mos. similis. Oblongo-ovalis, ferrugineus, griseo-setosus. Capite dense granuloso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico truncato, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis ferrugineis; prothorace longitudine latiore, medio rotundato-dilatato, lateribus ante angulos posticos sinuatis, angulis anticis paulo acutis, parum productis, prothoracis dorso, scutello elytrisque dense aciculato-punctatis, punctis setis

adpressis vestitis, elytris post scutellum bulbosis; pygidio confertim setifero-punctato. Corpore infra pedibusque dense setis obtectis; tibiis anticis tridentatis, dente primo obsoleto, tarsis posticis articulo primo secundo parum longiore, tarsis anticis articulo basali apice intus spinoso. — Long. 4 mm.

Matto Grosso (Corumba).

Dem *B. peruanus* Mos. ähnlich, ein wenig kürzer und daher breiter. Der Vorderrand des Clypeus ist im Gegensatz zu *peruanus* kaum merklich gebuchtet, die Ecken sind flacher gerundet. Die großen Borsten sind gleichfalls etwas schuppenförmig.

Hercitis Zikani n. sp.

♂. *H. testaceae* Mos. similis. Nigra, dense griseo-squamoso-setosa. Capite asperato-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis fuscis, 8-articulatis, flabello parvo; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis squamis setiformibus adpressis instructis; scutello elytrisque dense setifero-punctatis, setis squamiformibus; pygidio squamoso-setoso, squamis ad punctum in pygidii parte posteriore positam versus directis. Subtus ubique setis adpressis albidis vestita; tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum anticorum apice spinoso, unguibus omnibus apice fissis. — Long. 5 mm.

Brasilia (Minas Geraes). J. Zikan leg.

Die Art ist der *H. testacea* Mos. ähnlich, die Grundfarbe ist jedoch schwarz, der Clypeusrand ist stärker aufgebogen und kann merklich gebuchtet, die Vorderschienen des ♂ sind zweizählig.

Pseudohercitis n. gen.

Gen. *Barybas* Blanch. (*Microcrania* Burm.) affinis, differt antennis 8-articulatis.

Die nahe verwandten Gattungen, die Bürmeister unter dem Namen *Microcraniadae* zusammenfaßt, unterscheiden sich folgendermaßen:

Alle Krallen am Ende gespalten

Fühler 8gliedrig: *Hercitis* Burm.

Fühler 9gliedrig: *Ctilocephala* Burm.

An den 4 hinteren Füßen der größere Krallenzahn einfach

Fühler 8gliedrig: *Pseudohercitis* n. gen.

Fühler 9gliedrig: *Barybas* Blanch.

Pseudohercitis viridiaenea n. sp.

♂. Oblonga, convexa, viridi-aenea, albo-setosa, setis paulo squamiformibus. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, clypeo

late rotundato, medio subsinuato; antennis rufo-flavis, flabello parvo; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat dense punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello crebre setifero-punctato; elytris dense irregulariter aciculato-punctatis, punctorum setis adpressis, elytris juxta scutellum leviter bulbosis; pygidio crebre umbilicato-punctato, punctis squamis lanceolatis vestitis. Subtus pectoris medio parce, pectoris lateribus abdomineque densius punctatis, punctis squamoso-setosis; pedibus setosis, tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum anticorum elongato, apice intus spinoso, tarsis posticis articulo primo secundo paulo longiore. — Long. 6 mm.

Matto grosso (Corumba).

Pseudohercitis corumbana n. sp.

Fusca vel nigro-fusca, nitida, parum aenescens, albo-squamoso-setosa. Capite dense aciculato-punctato, punctis setosis, clypeo margine elevato, late rotundato; antennis rufo-flavis, flabello parvo; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre umbilicato-punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello dense setifero-punctato; elytris confertim aciculato-punctatis, punctis setosis, setis adpressis, inaequalibus, elytris singulis post scutellum bulbosis; pygidio dense umbilicato-punctato, punctis squamis ovalibus instructis. Subtus crebre setifero-punctata, tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis articulo basali elongato; articulo primo tarsorum posteriorum secundo parum longiore. — Long. 5,5 mm.

Matto grosso (Corumba).

Ctilocephala sarana n. sp.

♂. *C. brasiliensi* Mos. simillima, clypeo paulo brevior, prothoracis squamis paulo validioribus. Fusca, subnitida, griseo-squamoso-setosa. Capite granuloso-punctato, punctis squamosis, clypei margine antico late rotundato; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, medio angulatim rotundato, angulis anticis paulo productis, angulis posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis squamoso-setosis, squamis magnitudine inaequalibus; scutello crebre squamifero-punctato; elytris juxta suturam ante et post medium leviter impressis, dense punctatis, punctis squamoso-setosis, squamis inaequalibus, in impressionibus minutis; pygidio confertim annulato-punctato, punctis squamosis. Subtus cinereo-setosa, tibiis anticis in mare bidentatis, dente superiore minuto. — Long. 4,5—5 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Ctilocephala Kuntzeni n. sp.

Praecedenti simillima, paulo major, prothoracis angulis anticis haud productis. Fusca, subnitida, griseo-squamoso-setosa. Capite scabroso-punctato, punctis squamosis, clypeo late rotundato, lateribus levissime sinuatis; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso crebre punctato, punctis squamis angustis inaequalibus vestitis, vitta media plus minusve distincta, antice abbreviata, laevi; scutello setifero-punctato; elytris juxta suturam ante et post medium leviter impressis, dense punctatis, punctis setis squamiformibus, magnitudine inaequalibus, instructis; pygidio squamifero-punctato, squamis angustis. Subtus cinereo-setosa, tibiis anticis bidentatis, dente apicali longo, dente superiore minuto. — Long. 5—5,5 mm.

Bolivia (Prov. Sara). J. Steinbach leg. Mus. Berol.

Ceraspis subvittata n. sp.

Ex affinitate *C. Colonis* Burm. Testacea, albido-squamosa. Capite dense squamoso, clypei margine antico reflexo, in mare truncato, in femina late rotundato; antennis testaceis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus postice sinuatis, dorso albo-squamoso, vittis 2 vel 4 ochraceis ornato, vittis duabus internis setis pallidis suberectis instructis; scutello albido-vel flavido-squamoso; elytris dense albido-squamosis, singulis vittis 2 obscuris, antice et postice indistinctis ornatis; pygidio corporeque infra crebre albo-squamosis, pedibus albo-setosis; tibiis anticis bidentatis, unguibus posticis dente brevioris apice fissis. — Long. 4,5—5,5 mm.

Brasilia (Novo Friburgo). C. Beske leg.

Ceraspis setiventris n. sp.

♂. *C. Coloni* Burm. affinis. Testacea, supra ochraceo-vel albido-squamosa, subtus albo-setosa. Capite dense flavido-squamoso, squamis in frontis medio obscurioribus, clypeo maris reflexo, truncato, subsinuato; antennis testaceis; prothorace paulo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus post medium sinuatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense ochraceo-squamoso, vittis 4 longitudinalibus vittaque transversa curvata, ante prothoracis medium posita, albidis; scutello confertim squamoso; elytris vittis longitudinalibus albidis et obscurioribus ornatis, vittis duabus primis albidis post medium et ante apicem breviter dilatatis; pygidio confertim albido-squamoso, squamis ad pygidii medium versus directis. Subtus setis ad-

pressis vestita; tibiis anticis unidentatis, unguibus posticis dente brevior apice fisso. — Long. 5 mm.

Brasilia (St. Catharina). F. Schmalz leg. coll. Ohaus.

Ceraspis sulcicollis n. sp.

Ferruginea vel fusca vel nigro-fusca, albido-squamosa. Capite granuloso-punctato, punctis squamis acutis vestitis, clypeo margine antico elevato, late rotundato; antennis ferrugineis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus post medium fortiter sinuatis, dorso medio leviter longitudinaliter sulcato, dense albido-squamoso, vittis duabus, interdum antice dilatatis, fuscis; scutello fusco-vel albido-squamulato; elytris crebre squamis albidis vestitis, squamis interdum obscurioribus, albidis sparsis intermixtis; pygidio confertim albo-squamoso. Subtus dense albo-squamulata. tibiis anticis in utroque sexu bidentatis, unguibus posticis dente longiore integro, dente brevior fisso. — Long. 6,5—7,5 mm.

Brasilia (Sao Paulo, St. Catharina).

Ceraspis cinerea n. sp.

Nigra, cinereo-squamosa, pedibus interdum etiam elytris rufis. Capite granuloso-punctato, punctis squamosis, clypei margine antico reflexo, late rotundato; antennis ferrugineis; prothorace convexo, paulo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus post medium sinuatis, dorso crebre punctato, punctis squamis cinereis acuminatis vestitis; scutello confertim squamoso, squamis erectis; elytris cinereo-squamosis; pygidio confertim squamulato, squamis ad pygidii medium versus directis. Subtus albo-squamosa, pedibus setosis, tibiis anticis acute bidentatis, unguibus posticis dente majore integro, dente minore apice fisso. — Long. 8 mm.

Brasilia (Soa Paulo).

Ceraspis lepidiota n. sp.

♂. Ovata, nigra, albo-cinereo-squamosa. prothoracis elytrorumque squamis fundum haud ubique contegentibus, pedibus rufis. Capite squamoso, squamis acuminatis, clypeo margine antico elevato, rotundato; antennis rufo-testaceis; prothorace convexo, subquadrato, medio angulatim-rotundato, lateribus post medium leviter sinuatis, dorso albido-squamoso et parce setoso, scutello elytrisque squamis ovatis obtectis, squamis interdum juxta elytrorum suturam ante apicem densius positis; pygidio corporeque infra dense squamis ovatis, pedibus squamis setiformibus parce vestitis; tibiis anticis acute bidentatis, unguibus posticis dente majore integro, dente minore apice fisso. — Long. 6 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Ceraspis Kuntzeni n. sp.

♂. Ovata, rufo-testacea, capite prothoraceque rufis, supra griseo-, subtus albido-squamosa. Capite rugoso-punctato, squamis acuminatis obtecto, clypeo margine antico elevato, subrotundato; antennis rufo-flavis, flabello piceo; prothorace paulo latiore quam longiore, medio angulatim rotundato, lateribus post medium leviter sinuatis, dorso crebre squamoso, squamis ad dorsi medium versus setiformibus, vittis 4 longitudinalibus maculaque antemediana juxtalaterali ferrugineis; scutello setis erectis ferrugineis dense vestito; elytrorum setis acuminatis; pygidio densissime squamis albidis ovatis obtecto. Corpore infra confertim squamoso, abdomine segmento ultimo macula parva setosa ornato; tibiis anticis bidentatis, unguibus posticis dente brevior apice fissis, dente longiore integro. — Long. 6 mm.

Brasilia (Salto grande). Mus. Berol.

Ceraspis griseo-squamosa n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, fusca, dense griseo-squamosa. Capite rugoso-punctato, squamis lanceolatis ornato, clypeo margine paulo elevato, rotundato; antennis rufo-flavis, flabello piceo; prothorace paulo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus post medium leviter sinuatis, dorso squamis lanceolatis obtecto, squamis in dorsi medio suberectis; scutello confertim erecte setoso; elytris dense squamosis, squamis ovalibus, acuminatis; pygidio squamis ellipticis dense vestito. Subtus confertim squamosa, squamis ovatis, ante abdominis segmenti penultimi marginem posticum acuminatis, segmento ultimo medio macula parva setosa instructo; pedibus fuscis, femoribus tibiisque in parte basali rufis; tibiis anticis acute bidentatis, unguibus posticis dente majore integro, dente minore fissis. — Long. 7,5 mm.

♀. A mare differt frontis prothoracisque mediis fusco-squamoso-setosis. — Long. 9 mm.

Brasilia. Mus. Berol.

Ceraspis mutica n. sp.

♂. Ovalis, nigra, supra cinereo- subtus albido-squamosa, femoribus rufis. Capite aciculato-punctato, punctis squamosis, clypeo margine antico reflexo, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis piceis; prothorace paulo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus post medium leviter sinuatis, dorso medio longitudinaliter sulcato, sat dense squamis angustis vestito; sulco angulisque posticis squamis nonnullis albis ornatis; scutello squamulato; elytris squamis parvis ovalibus obtectis, macula parva postmediana, plus minusve distincta, alba; pygidio squamis ellipti-

cis albis dense vestito. Subtus pectoris squamis angustis, abdominis squamis paulo latioribus, pedibus albo-setosis, tibiis anticis uno dente apicali rufo instructis, unguibus posticis dente longiore integro, medio paulo dilatato, dente brevior apice fisso. — Long. 5,5 mm.

Brasilia (Porto Alegre).

Ceraspis Ohausi n. sp.

♂. Oblonga, postice angustata, testacea, nitida, griseo-setosopilosa. Capite dense granuloso-punctato, punctis setis adpressis vestitis. clypei margine antico reflexo, leviter sinuato; antennis testaceis, 9-articulatis, stipitis articulis 3.—5. elongatis, flabello maris stipite brevior; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus antice et postice sinuatis, angulis anticis et posticis fere rectangulis, dorso confertim aciculato-punctato, punctis breviter pilosis, pilis longioribus fere rectis; scutello dense setifero-punctato; elytris rugosis, mediocriter crebre setis adpressis vestitis, pilis longioribus erectis seriatim positus; pygidio umbilicato-punctato, punctis setosis, setis ad pygidii medium versus directis. Subtus alutacea, sat dense aciculato-punctata, punctis piloso-setosis; tibiis anticis bidentatis, unguibus posticis dentibus duobus fissis. — Long. 9 mm.

Ecuador (Loja). Dr. F. Ohaus leg. X. 1905.

Ancistrosoma argentinum n. sp.

♂. Nigrum, nitidum, clypeo, antennis, pygidio pedibusque rufis. Capite, frontis medio parce, frontis lateribus clypeoque dense punctatis, punctis setosis, clypeo antice producto, margine antico reflexo, emarginato; prothorace anguste albo-cincto, linea media longitudinali et utrinque vitta antemediana albo-squamosis; scutello, basi excepta, squamis parvis albis setiformibus obtecto; elytris singulis quadrisulcatis, sulcis squamis minutis albis instructis, vitta prima et secunda antice haud abbreviatis; pygidio convexo, medio glabro, juxta latera setis albis ornato. Subtus pectore abdomineque dense albo-pilosis, coxarum posticarum, lateribus, abdominis medio segmentorumque margine antico laevibus, segmento primo medio processu obliquo armato; tibiis anticis tridentatis, unguibus anticis et medicis integris, unguibus posticis fissis, sed dente interno minimo. — Long. 21 mm.

Argentina (Salta). C. Bruch leg.

Diplotaxis microtrichia n. sp.

Oblongo-ovalis, supra nigro-aenea plus minusve cupreo-micans, subtus fusca, pedibus rufo-fuscis, breviter cinereo-pilosis. Capite

dense subrugoso-punctato. punctis pilosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, sinuato, angulis anticis subacutis; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis acutis, angulis posticis obtusis, dorso sat crebre pilifero-punctato. pilis recumbentibus; scutello dense punctato; elytris fortiter subrugoso-punctatis, punctis pilosis, costis haud convexis; pygidio leviter rugoso, annulato-punctato, punctis pilis erectis vestitis. Subtus sat crebre, abdominis medio parcius, pilifero-punctata, abdominis lateribus haud carinatis; tibiis anticis tridentatis, tarsis maris infra barbatis, unguibus dente apicali longiore et angustiore. — Long. 10—11 mm. Mexico (Coatepec, Huatusco). coll Flohr.

Diplotaxis simillima n. sp.

Praecedenti simillima, differt fronte convexiore, clypeo longiore, clypei lateribus ante apicem distinctius sinuatis, abdominis marginibus lateralibus minus rotundatis, femoribus tibiisque obscurioribus. — Long. 9—10 mm.

Mexico (San Blas), Tepic. coll. Flohr.

Diplotaxis albosetosa n. sp.

D. corrosae Bates similis, praecipue differt supra albo-setosa nigro- vel fusco-aenea, nitida. Capite dense confluentur punctato, parce setoso, clypeo trapezoidali, margine antico fortiter elevato, sinuato, angulis anticis angulatis; antennis fuscis, flabello piceo; prothorace latiore quam longiore, post medium roduntato-dilatato, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso crebre punctato, punctis juxta prothoracis latera setosis; scutello punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis setis squamiformibus vestitis, costis angustis, plus minusve distinctis; pygidio fortiter punctato, erecte setoso. Subtus medio sat remote, juxta latera dense setifero-punctata, abdominis lateribus haud carinatis; tibiis anticis tridentatis, unguibus normalibus. — Long. 5.5—6 mm.

Mexico (Sierra Mixteca). C. A. Purpus leg. Mus. Berol.

Diplotaxis rufipes n. sp.

Statura *D. parvulae* Burm. Supra nigra, glabra, nitida, subtus nigro-fusca, pedibus rufis. Capite dense punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis; prothorace transverso, post medium rotundato-dilatato, lateribus ante medium levissime sinuatis, angulis anticis, paulo acutis, angulis posticis rotundatis, dorso dense punctato; scutello laevi; elytris alutaceis, sat remote subtiliter punctatis, costis planis, impunctatis; pygidio haud crebre

punctato, punctis pilosis. Subtus medio parce, ad latera versus densius pilifero-punctata, abdominis lateribus haud carinatis; tibiis anticis tridentatis, unguibus normalibus. — Long. 5,5—6 mm.

Mexico (Sierra Mixteca). C. A. Purpus leg. Mus. Berol.

Diplotaxis Ohausi n. sp.

Oblonga, nigro-aenea, capite, prothorace scutelloque nigro-cupreis, pedibus fusco-cupreis. Capite mediocriter crebre punctato, clypeo brevi, antrosum angustato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis; prothorace latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, his breviter rotundatis, dorso mediocriter dense punctato; scutello juxta latera punctis nonnullis instructo; elytris irregulariter punctatis. costis fere planis, subtiliter seriato-punctatis; propygidio pygidioque fortissime punctatis, punctis pilosis. Subtus medio parce, juxta latera densius punctata, punctis brevissime setosis, abdominis lateribus haud carinatis; tibiis anticis tridentatis, unguibus dente apicali paulo brevior et paulo angustior. — Long. 9,5 mm.

Guatemala (Coyotenango). Riedel leg. VI. 1902. coll. Ohaus.

Lachnosterna monana n. sp.

♂. *L. parallelae* Blanch. similis, sed supra haud pilosa. Oblonga. testacea, nitida, capite, prothorace scutelloque rufis. Capite subrugoso-punctato, clypeo rotundato, margine antico reflexo, medio leviter sinuato; antennis testaceis, 9-articulatis, flabello maris minuto; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, lateribus leviter crenulatis, ciliatis, dorso laxo punctato; scutello punctis nonnullis oblecto; elytris leviter rugosis, mediocriter dense punctatis, elytris singulis una costa parum convexa, sparsissime punctata et postice dilatata instructis; pygidio remote, antice densius punctato. Subtus pectore parce piloso, abdomine convexo, medio sparsissime, ad latera versus crebrius punctato, punctis breviter pilosis, segmento ultimo transversim sulcato; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longitudine aequali, unguibus dente mediano armatis. — Long. 15 mm.

Ins. Mona. C. Bock leg. Mus. Hamburg.

Hoplia lineata n. sp.

H. inopsi Bates similis, praecipue differt squamis ovalibus. Oblongo-ovalis, nigro-fusca, elytris pedibusque plus minusve rufescentibus, supra dense squamosa. Capite, fronte squamis angustis

obtecta, clypeo margine antico reflexo, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-fuscis, 10-articulatis, articulis tribus primis pallidioribus; prothorace paulo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso fusco-squamoso, lateribus vittisque tribus disci cinereis, vitta media plus minusve obsoleta; scutello fusco-squamoso; elytris squamis fuscis dense obtectis, elytris singulis sutura, lineis tribus maculae oblonga anteapicali cinereis; pygidio corporeque infra crebre albido-squamosis; tibiis anticis tridentatis, unguibus posticis haud fassis. — Long. 4,5—5 mm.

Mexico (Cordova). coll. Flohr.